UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

ANNÉE 1947 N° 95

TUBERCULOSE PULMONAIRE ET GROSSESSE

Statistiques de la Clinique Baudelocque
Années 1944 et 1945

THÈSE

POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue publiquement en novembre 1947

PAR

Jean VAUBAN

MEMBRES DU JURY

MM. GARIPUY *Président*
MOREL
GUILHEM *Assesseurs*
LASSERRE
DARNAUD *Suppléant*

PARIS
JOUVE & C^ie^ ÉDITEURS
15, RUE RACINE, 15

1947

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

ANNÉE 1947 N° 95

TUBERCULOSE PULMONAIRE ET GROSSESSE

Statistiques de la Clinique Baudelocque
Années 1944 et 1945

THÈSE

POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue publiquement en novembre 1947

PAR

Jean VAUBAN

MEMBRES DU JURY

MM. GARIPUY *Président*
MOREL
GUILHEM *Assesseurs*
LASSERRE
DARNAUD *Suppléant*

PARIS
JOUVE & Cie ÉDITEURS
15, RUE RACINE, 15

1947

A MON PÈRE

A MA MÈRE

En remerciement des sacrifices qu'ils se sont imposés et en témoignage de ma profonde affection.

A MA SŒUR

A NOTRE JURY DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR GARIPUY

Professeur de Clinique obstétricale à la Faculté de Médecine de Toulouse
Chevalier de la Légion d'honneur
Croix de guerre 1914-1918

Qui nous a fait le grand honneur d'accepter la présidence de cette thèse.
Nos respectueux hommages.

MONSIEUR LE PROFESSEUR MOREL

Professeur de Pathologie interne à la Faculté de Médecine de Toulouse

MONSIEUR LE PROFESSEUR GUILHEM

Professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse
Chargé des cours d'Obstétrique

MONSIEUR LE DOCTEUR LASSERRE

Médecin Phtisiologue des Hôpitaux
Chargé de cours à la Faculté

MONSIEUR LE PROFESSEUR DARNAUD

Professeur agrégé à la Faculté

A Monsieur le Professeur E. LÉVY-SOLAL

Professeur de Clinique obstétricale à la Faculté de Médecine de Paris
Accoucheur de la Maternité Baudelocque
Membre de l'Académie de Médecine
Officier de la Légion d'honneur

Qui nous a accueilli avec bienveillance dans son Service et dont nous avons pu apprécier le remarquable enseignement.
Notre respectueuse reconnaissance.

A Monsieur le Docteur P. MORIN

Gynécologue-Accoucheur des Hôpitaux de Paris

Qui nous a inspiré le sujet de cette thèse et nous a fait bénéficier de son expérience.
Tous nos remerciements.

A Monsieur le Docteur F. HANON

Gynécologue-Accoucheur Assistant des Hôpitaux de Paris
Chevalier de la Légion d'honneur

A TOUS MES ANCIENS MAITRES

MEIS ET AMICIS

TUBERCULOSE PULMONAIRE ET GROSSESSE

Statistiques de la Clinique Baudelocque

Années 1944-1945

INTRODUCTION

Depuis deux ans que nous fréquentons la Maternité Baudelocque, nous avons été frappés par le nombre de femmes tuberculeuses gravides envoyées dans le Service, soit parfois par des Services spécialisés, soit le plus souvent par des praticiens de la ville, pour envisager l'éventualité d'une interruption de la grossesse.

Après un temps suffisant d'observation (8 à 15 jours), ces femmes quittent la Maternité sans qu'aucune intervention ait été pratiquée, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. Et bien souvent, ces femmes, qui nous avaient été envoyées dans les premiers mois de leur grossesse soit pour une chute de l'état général, soit pour des signes fonctionnels marqués (en particulier des hémoptysies), soit pour une aggravation radiologique des lésions antérieures à l'état de gestation, nous les voyons revenir dans le Service au moment de leur accouchement; nous apprenons alors que, sous l'effet d'une cure de repos et d'un traitement approprié, leur grossesse a été, par la suite, bien tolérée.

Ces faits souvent observés nous ont amenés à entreprendre des recherches pour voir quel est actuellement le pourcentage de tuberculoses aggravées par l'état de gravidité. Car il est indéniable que les données du problème qui se posait il y a quelques dizaines d'années ne sont plus aujourd'hui les mêmes : avec les nombreux Dispensaires et Services spécialisés qui fonctionnent actuellement un peu partout, les tuberculeuses sont suivies beaucoup plus régulièrement qu'autrefois; et il faut noter aussi le fait que, si l'on n'a pas encore trouvé « l'antidote » de la tuberculose, les moyens thérapeutiques mis à notre disposition ont quand même enregistré de sensibles progrès.

Nous avons pris, comme base de notre travail, toutes les femmes atteintes de tuberculose pulmonaire ancienne ou récente qui ont accouché à Baudelocque pendant les années 1944 et 1945. Nous nous sommes efforcés de retrouver ces femmes pour savoir ce qu'elles

étaient devenues après leur sortie de la maternité. Nous avons ensuite classé les observations en plusieurs catégories :

a) Tuberculoses non aggravées par la grossesse ;
b) Tuberculoses aggravées pendant la grossesse ;
c) Tuberculoses aggravées uniquement pendant les suites de couches ;
d) Tuberculoses cliniquement apparues pendant la grossesse ou après un accouchement ou un avortement.

Dans le même ordre d'idées, nous avons ensuite pris les avortements thérapeuthiques pratiqués à Baudelocque pendant les années 1935 à 1945 ; nous y avons ajouté les avortements normaux des femmes tuberculeuses qui ont eu lieu dans le Service en 1944 et 1945,

Et de toutes ces stastistiques, nous avons essayé de tirer les conséquences thérapeutiques et la conduite à tenir pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et pendant les suites de couches chez une femme tuberculeuse qui devient enceinte.

STATISTIQUES ANTÉRIEURES ET STATISTIQUES DE BAUDELOCQUE

L'examen des statistiques antérieures révèle que tous les auteurs n'avaient pas la même opinion sur le pourcentage d'aggravations de la tuberculose pulmonaire par l'état puerpéral; les différences notables entre les chiffres publiés tiennent en partie au fait que les statistiques n'ont pas toutes été établies dans les mêmes conditions.

Commandeur, en 1908, donnait 90 % d'aggravations.
Kaminer (1909) : 61 %.
Tecon (1913) : 61,9 %.
Begtrup Hansen (1917) : 36,7 %.
Peaud (1920) : 39 %.
Bar (1922) : 54 %.
Sergent : 25,85 %.
Léon Bernard : 50 %.
Cordier : 47 %.
Voron (Congrès des Gyn. et Obst. de langue française en 1923) : 60 %.
Weymeersch et Olbrechts (au même Congrès) :

a) Tuberc. bénignes (fibreuses, cicatrisées, pleurales) antérieures à la grossesse, 75 cas, soit :

Stationnaires : 44 (59 %)
Aggravations légères et momentanées : 23 (31 %)
Aggravations sévères et définitives : 4 (5 %)
Décès dans un délai de moins de 2 ans : 4 (5 %).

b) Tub. fibro-caséeuses évolutives antérieures à la grossesse, 56 cas, soit :

Stationnaires : 6 (10,7 %)
Aggravations légères : 12 (21,4 %)
Aggravations sévères : 17 (30,4 %).
Décès : 21 (37,5 %).

c) Tuberc. devenues cliniquement évidentes pendant la grossesse ou après l'acc., 64 cas, soit :

Formes fibreuses, pleurales bénignes : 21 (33 %)

Formes fibro-caséeuses à tendance plus ou moins évolutive 23 (36 %).
Décès : 20 (31 %).

L'influence nocive de la grossesse sur la tuberculose pulmonaire apparaît donc, selon ces auteurs, comme considérable, principalement dans les formes fibro-caséeuses. Or, nos conclusions diffèrent, et même pour des formes graves de tuberculose nous n'avons pas l'impression que la grossesse entraînait des aggravations importantes. Pour nous en tenir aux résultats brutaux des chiffres, voici ce que nous avons observé :

Nombre total d'observations : 260.
Tuberc. non compliquées par la grossesse : 141, soit 54,2 %.
Tuberc. compliquées pendant la grossesse : 39, soit 15 %.
Tuberc. compliquées uniquement pendant les suites de couches :

Après une grossesse normale : 17
Après un avortement : 2
19, soit 7,3 %.

Tub. à début cliniquement apparent à l'occasion d'une gestation : 61, soit 23,5 %.

Début pendant la grossesse : 50, soit 19,25 %
Début après un accouchement : 9
Début après un avortement : 2
11, soit 4,25 %.

Mais, pour établir cette statistique, nous avons tenu compte des grossesses précédentes. C'est ainsi que nous avons placé dans les cas de tuberculoses compliquées pendant la grossesse des femmes dont la tuberculose s'était aggravée au cours d'une grossesse antérieure à celle de 1944 ou 1945. Nous avons agi de même pour les tuberculoses compliquées pendant les suites de couches ou apparues à l'occasion d'une gestation. Si l'on tient compte uniquement de la grossesse qui a eu lieu en 1944 ou 1945, nous pouvons faire entrer dans les tuberculoses non compliquées par la grossesse, les observations suivantes classées dans les :

Tuberc. compliquées pendant la grossesse : obs. nos 559 et 1557 (année 1944).
Tuberc. compliquées pendant les suites de couches :

Après une grossesse normale : obs. no 1906 (année 1944) ; obs. nos 852, 1015 (année 1945).
Après un avortement : obs. no 1991 (année 1944) et 1847 (année 1945).

Tuberc. à début cliniquement apparent à l'occasion d'une gestation :

Début pendant la grossesse : obs. nos 177, 370 (année 1944) ; obs. nos 1540, 1540 (année 1945).

Début après un accouchement : obs. nos 1871, 2362, 2541 (année 1944) ; obs. nos 1328, 1846, 2330 (année 1945).

Début après un avortement : obs. nos 388, 2143 (année 1944).

On arrive alors aux résultats suivants :

Nombre total d'observations : 260.
Tuberc. non compliquées par la grossesse : 160, soit 61,5 %.
Tuberc. compliquées pendant la grossesse : 37, soit 14,2 %.
Tuberc. compliquées après une grossesse normale : 14, soit 5,4%.
Tuberc. à début cliniquement apparent à l'occasion d'une gestation :

Début pendant la grossesse : 46
Début après un accouchement : 3
49, soit 18,9 %.

Il reste enfin à noter que, toutes les femmes n'ayant pu être retrouvées, le nombre de tuberculoses compliquées après une grossesse normale est susceptible d'être augmenté.

TUBERCULOSES NON COMPLIQUÉES PAR LA GROSSESSE

Nombre d'observations : 141.
Parité par rapport à l'apparition de la tuberculose :

Primipares : 104
Multipares : 37.

Ancienneté de la tuberculose par rapport à la grossesse :

Moins d'un an : 15
Entre 1 et 2 ans : 12
Entre 2 et 3 ans : 21
Entre 3 et 4 ans : 13
Entre 4 et 5 ans : 13
Plus de 5 ans : 67.

53 femmes étaient porteuses d'un PNO unilatéral.
6 femmes étaient porteuses d'un PNO bilatéral.
2 femmes avaient eu une phrénicectomie.
1 femme avait eu une thoracoplastie.

Accouchement :

Acc. N. : 115
Forceps : 22

Application systématique : 9
Pour non progression : 5
Pour fatigue maternelle : 3
Pour souffrance fœtale : 1
Après incisions du col : 4.

Césariennes : 4

Pour rétrécissement du bassin : 3
Pour anomalies de dilatation : 1.

Délivrance :

D. N. : 125
D. N. hémorragique : 2

R. U. : 3
D. A. : 7.
Pour non décollement : 3
Pour hémorragie : 4.

Etat pulmonaire actuel : 83 femmes sur 141 ont pu être retrouvées.
Etat satisfaisant : 74
Etat stationnaire : 5
Etat aggravé : 3
Décès : 1.

FEMMES RETROUVÉES

Année 1944

Obs. N° 78. — D... M., 27 ans, II-pare.
1° 1937 : Acc. N. à T. : 5.000, bpt ; D. N. ; S. de C. N.
Février 43 : Episode pulmonaire aigu.
Mars 43 : Lésion parenchymateuse G. ; B. K. +.
Avril 43 : PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
2° Le 11 janvier 44 : Acc. N. à T. : garçon, 4.300, B. C. G. ; D. N. ; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant, insufflations toutes les 6 semaines.
Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 141. — C... P., 33 ans, I-pare.
Mai 29 : Lésion G. ; B. K. + ; PNO G. total.
15 mois après, grosse réaction liquidienne entraînant 2 ponctions et cessation des insufflations. Traitement par l'allergine. Reprise d'une vie normale en 1932 après constatation de la guérison clinique et radiologique.
Mars 1940 : Episode pulmonaire dit « grippal » ; toux ; crachats hémoptoïques ; amaigrissement léger ; B. K. +.
Repos pendant 6 mois. Depuis bon état général. B. K. 0 en février 43.
Grossesse normale ; scopie de novembre 43 : hémirétraction G., déviation de la trachée et du cœur à G. ; obscurcissement général du champ pulmonaire G.; petite image annulaire sous-claviculaire G.
Le 21 janvier 44 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.650 ; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : stationnaire à l'examen radiographique.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 144. — S... M.-L., 28 ans, I-pare.
Novembre 39 : Caverne du sommet G.; B. K. +; PNO G., suivi de 2 sections de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale ; scopie de décembre 43 : à G., PNO limité, gros épaississement pleural ; petite réaction liquidienne.

Le 22 janvier 44 : A T., forceps après incisions du col pour anomalies de la dilatation et œdème du col : fille, 3.160, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant ; PNO arrêté depuis septembre 46.

Etat actuel de l'enfant : bon état général, urticaire.

Obs. N° 148 bis. — S... G., 19 ans, I-pare.

1941 : Lésion du sommet D.; B. K. +; PNO D., suivi d'une section de brides ; B. K. : O.

Grossesse normale.

Le 19 janvier 44 : A T., forceps à dilatation complète : fille, 3.040, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 306. — K... R., 27 ans, II-pare.

1° 1938 : Acc. à T. par le siège : 3.500, bpt ; D. N.; S. de C. N.

Février 41 : Adénopathie cervicale, taches au sommet D., B. K. 0.

Séjour en sana jusqu'en mars 43.

Grossesse normale ; scopie de novembre 43 : sommets s'éclairant à la toux, images en traînée d'aspect cicatriciel.

2° Le 10 février 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.620, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 351. — D... J., 31 ans, I-pare.

1935 : Lésion du sommet G., expectoration légèrement hémoptoïque, B. K. 0 ; PNO G. entretenu jusqu'en 1938, la lésion étant alors cicatrisée.

Grossesse normale ; scopie de janvier 44 : sommets s'éclairant bien à la toux, hile D. un peu chargé, cul-de-sac diaphragmatique G. se déplissant moins bien, légère rétraction de l'hémithorax G.

Le 17 février 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.270, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 497. — K... S., 29 ans, I-pare.

1929 : Infiltration du sommet D. avec B. K. +.

1930 : 3 tentatives infructueuses de PNO D.

Séjour en sana jusqu'en 1935 : guérison ; B. K. : 0 ; jamais de rechute.

Grossesse normale.

Le 5 mars 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.980, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant avec bon état général après une rechute en octobre 45.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 508. — L... D., 36 ans, I-pare.
Août 31 : Lésion du sommet D. avec B. K. +.
Séjour en sana pendant 1 an. B. K. : 0 rapidement.
Est considérée comme guérie depuis 1934.
Grossesse normale ; scopie de novembre 43 : calcification sous-claviculaire D.; hiles accentués des deux côtés.
Le 7 mars 44 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.640 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.
A accouché de nouveau en août 45 (voir année 1945, obs. n° 1.856).

Obs. N° 537. — A... T., 32 ans, IV-pare.
3 acc. N. : enfants pesant entre 2.500 et 3.000 ; D. N. ; S. de C. N.
Asthme bronchique infantile.
1942 : Tuberculose rénale G. avec B. K. + dans les urines.
Début 43 : Taches au 1/3 supérieur du poumon D.
Grossesse normale.
Le 10 mars 44 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.250 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : stabilisé.
Enfant décédé à 2 mois de broncho-pneumonie.

Obs. N° 540. — D... R., 28 ans, I-pare.
1934 : Hémoptysie, lésions au sommet G.
Séjour en sana pendant 1 an.
Scopie de 1942 : Image de condensation pulmonaire limitée, sans aspect évolutif, dans la région sous-claviculaire G.
Scopie de 1943 : Sommets un peu infiltrés, lésion G. guérie.
Grossesse normale.
Le 11 mars 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 572. — P... H., 23 ans, I-pare.
1937 : Lésion du sommet G.; B. K. + pendant 2 ans ; PNO G. avec réaction liquidienne minima, entretenu jusqu'en 1939 : lésion alors cicatrisée.
Grossesse normale ; scopie de janvier 44 : à G., ombre ovalaire sous-claviculaire appliquée le long de la paroi postéro-supérieure, d'environ 10 cm. de hauteur. Accentuation parenchymateuse au niveau des deux hiles.
Le 15 mars 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.350 ; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 662. — M... S., 24 ans, II-geste, I-pare.

1° 1942 : Avortement provoqué de 2 mois, suivi de curettage.

1939 : Hémoptysie sans signes radiologiques ni bactériologiques.

Janvier 40 : Hémoptysie abondante ; lésion du sommet D.; B. K. +; PNO D.; B. K. : 0.

Août 40 : Hémoptysie ; lésion non évolutive du poumon G.; B. K. 0.

Octobre 40 : Hémoptysie ; lésion évolutive du sommet G.; B. K. +; PNO G. suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Avortement de 1942 sans influence sur l'état pulmonaire.

Grossesse normale.

2° Le 26 mars 44 : Forceps à dilatation complète : garçon, 2.850, B. C. G., présentant une atrophie des 4 derniers doigts de la main D.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 726. — R... R., 36 ans, V-pare.

4 grossesses antérieures sans influence sur la tuberculose : 4 acc. N. à T. (3 enfants, bpts ; 1 enfant avec spina bifida décédé à 6 mois 1/2).

1930 : Amaigrissement ; toux ; fatigue ; expectoration ; B. K. +; radio : lésions bilatérales.

Traitement par sels d'or et gluconate de calcium.

Grossesse normale ; scopie de janvier 44 : sommets s'éclairant mal à la toux ; hiles chargés ; image de tramite accentuée surtout à D.; culs-de-sac libres ; pas d'images cavitaires.

Le 2 avril 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.800, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : obscurité des deux sommets, surtout à D. où l'infiltration descend presque jusqu'au hile ; lésions non évolutives.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 803. — D... A., 23 ans, I-pare.

1936 : Lésion G.; B. K. +; PNO G.; B. K. : 0.

1941 : Cessation du PNO : guérison.

Grossesse normale.

Le 12 avril 44 : A T., forceps à dilatation complète : fille, 3.000 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 826. — L... F., 36 ans, II-pare.

1° 1928 : Acc. N. à T. : 3.000, bpt ; D. N.; S. de C. N.

1941 : Caverne du sommet G., B. K. + ; PNO G., entretenu depuis, B. K. : 0.

Grossesse normale.

2° Le 15 avril 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.450, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 925. — R... R., 41 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 22 et 34 : 3.000 et 2.750, bpts ; D. N.; S. de C. N.

1940 : Lésions bilatérales surtout marquées à G., B. K. +.

Séjour en sana pendant 8 mois ; B. K. : 0.

Grossesse normale ; scopie de décembre 43 : tractus fibreux bilatéraux surtout à G.

Le 29 avril 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.250 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 987. — C... M., 40 ans, II-pare.

1° 1936 : Acc. N. à T. : fille 3.050 ; D. hémorragique ; S. de C. N.

1934 : Hémoptysie, B. K. +, petite lésion du sommet G.

Repos pendant 6 mois à la campagne ; au retour, bon état général, B. K. 0.

Pas d'aggravation par la 1re grossesse.

1941 : Hémoptysie, B. K. +, nouvelle petite lésion évolutive du sommet G. à côté de l'ancienne calcifiée.

Repos à la campagne ; B. K. : 0.

2e grossesse normale ; scopie de mars 44 : à G., calcifications hilaires, 2 calcifications sous-claviculaires, pas d'image évolutive.

2° Le 8 mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.150, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Juin 45 : Hémoptysies répétées, nouvelle lésion évolutive du sommet G.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 998. — S... L., 21 ans, I-pare.

Octobre 40 : Pleurésie G., B. K. +; PNO G., interrompu en mai 43 pour symphyse progressive ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 9 mai 44 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.320, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : en amélioration.

Etat actuel de l'enfant : bon.

A accouché de nouveau, après une grossesse normale, le 6 avril 46 : fille 2.830.

Obs. N° 1002. — C... G., 38 ans, I-pare.

1942 : Lésion G., B. K. +.

Séjour en sana ; calcium I.-V.; B. K. : 0.

Grossesse normale.
Le 9 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.670 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1066. — L... R., 30 ans, I-pare.
1936 : Voile au poumon D., B. K. 0.
Séjour à la campagne pendant 1 an.
Grossesse normale ; scopie de février 44 : sommets semblant s'éclairer moins bien à la toux, mais pas d'image parenchymateuse ; quelques arborisations hilaires bilatérales ; sinus normaux.
Le 19 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.420 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1205. — F... J., 20 ans, I-pare.
1941 : Lésion du sommet G., B. K. +; PNO G., entretenu jusqu'en septembre 43 ; B. K. : 0.
Grossesse normale ; scopie d'avril 44 : à G., aspect cicatriciel de la lésion ; à D., I. T. N.
Le 5 juin 44 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.650 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Février 45 (8 mois après l'acc.) : Hémoptysie de moyenne abondance.
Mai 45 : Hémoptysie abondante, B. K. +, caverne du sommet D.
Juin 45 : PNO D., suivi d'une section de brides.
Août 45 : La lésion G. recommence à évoluer en même temps que de nouvelles taches apparaissent et la malade est décédée le 8 octobre 45.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1530. — L... S., 24 ans, I-pare.
1943 (au début de) : Pleurésie G. suivie de congestion pulmonaire G., B. K. +; PNO G.; séjour en sana ; B. K. : 0 ; réaction liquidienne importante.
Grossesse normale.
Le 22 juillet 44 : Forceps à dilatation complète : fille, 2.920. ; D. A. pour non décollement ; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : liquide jusqu'à la clavicule G., légère infiltration à D.
Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 1531. — R... L., 33 ans, VII-pare.
6 grossesses antérieures en 31, 32, 33, 34, 37 et 39.
Mai 43 : Caverne du sommet D., B. K. +.
Juin 43 : PNO D.; petite réaction liquidienne ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 22 juillet 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.000 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : PNO D., interrompu en juillet 46.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1621. — T... L., 21 ans, I-pare.

Juillet 43 : Petit foyer sous-claviculaire D., B. K. 0.
Repos à la campagne.
Grossesse normale.
Le 3 août 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.330 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.
A accouché de nouveau, après une grossesse normale, le 7 mai 46.

Obs. N° 1714. — B... M., 34 ans, II-pare.

1° 1937 : Acc. N. à T. : 4.000, bpt ; D. N.; S. de C. N.
1941 : Lésions G., légère infiltration D., B. K. +; PNO G., entretenu depuis.
B. K. 0 depuis 1943.
Grossesse normale.
2° Le 17 août 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.200 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : stationnaire.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1786. — T... S., 43 ans, III-pare.

1° 1930 : Acc. prématuré à 6 mois : jumeaux mort-nés ; D. N.; S. de C. N.
2° 1938 : Acc. N. à T. : 3.750, bpt ; D. N.; S. de C. N.
1938 : B. W. ++.
1940 : Lésions D., B. K. +; PNO D., entretenu jusqu'en 1942 ; B. K. : 0.
1942 : Lésion caverneuse G., B. K. +; PNO G., entretenu jusqu'en fin 43 ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 30 août 44 : Acc. N. à T. : garçon, 4.100 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc.: état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1980. — C... J., 34 ans, III-geste, II-pare.

1° 1934 : Acc. N. à T. : 3.000, bpt ; D. N.; S. de C. N.
2° 1942 : Avortement spontané de 5 mois ; suites normales.
Septembre 43 : Caverne du sommet D., B. K. +; PNO D., suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 26 septembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.850, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : PNO D. arrêté en février 46.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2022. — L... R., 32 ans, II-pare.

1° 1929 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

1931 : Lésion du sommet G.; PNO G., entretenu jusqu'en 1934 : guérison.

Grossesse normale.

Le 2 septembre 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : garçon, 2.650, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2154. — G... A., 36 ans, I-pare.

Mars 39 : Laryngite, infiltration du sommet G., B. K. +.

Décembre 39 : Excavation du sommet G., B. K. +; PNO G., suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 24 octobre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.300 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : PNO G., arrêté en juillet 45.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2349. — C... T., 37 ans, I-pare.

1935 : Lésion G., B. K. +; PNO G., entretenu jusqu'en 1940 ; B. K. : 0 3 mois après.

1937 : Lésion du sommet D., B. K. +; PNO D.; B. K. : 0 3 mois après.

Grossesse normale.

Le 19 novembre 44 : Forceps pour lenteur de l'expulsion et fatigue maternelle : fille, 2.800, B. C. G.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon, PNO D., arrêté en novembre 45.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2364. — F... M., 31 ans, II-pare.

1° 1939 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

A l'âge de 19 ans : lésion D.; PNO D., entretenu pendant 2 ans 1/2.
Actuellement : radio normale.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 21 novembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.090 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2382. — J... D., 23 ans, I-pare.

1941 : Caverne du sommet G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.

1942 : Lésion D., B. K. + pendant 8 mois ; PNO D., entretenu depuis.

Grossesse normale.

Le 23 novembre 44 : Forceps à dilatation complète : fille, 2.950, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2421. — R... M., 27 ans, I-pare.

Juin 37 : Lésion G.; PNO G., entretenu jusqu'en février 38. Séjour en sana.

Grossesse normale.

Le 29 novembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.390, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : R. à S. au point de vue pulmonaire ; dépression nerveuse d'une durée de 10 jours, 3 semaines après l'acc.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2478. — B... J., 34 ans, III-pare.

1° 1936 : Acc. prématuré à 8 mois : 2.320, bpt ; D. N.; S. de C. N.

2° 1942 : Acc. N. à T. : mort-né macéré ; D. N.; S. de C. N.

1929 : Lésions du sommet D., B. K. +; PNO D., entretenu en mars 29 à août 34 ; B. K. : 0.

1930 : Syphilis primaire.

Grossesse normale ainsi que les précédentes.

Le 8 décembre 44 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.440 ; B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2545. — B... B., 30 ans, III-pare.

1° 1940 : Forceps à T.: 3.000, bpt ; D. N.; S. de C. N.

2° 1942 : Acc. N. à T.: 3.000, bpt; D. N.; S. de C. N.

Août 39 : Hémoptysie, lésion G., B. K. +.

Janvier 40 : PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que les précédentes.

Le 17 décembre 44 : Acc. par le siège : garçon, 2.700, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2598. — D... L., 26 ans, II-pare.

1° 1941 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Mars 43 : Infiltration du sommet G., B. K. + ; PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale.
Le 23 décembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.850 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2613. — D... H., 21 ans, I-pare.

Juillet 43 : Infiltration sous-claviculaire D. avec image cavitaire ; B. K. +.

PNO D. abandonné en novembre 43 pour réaction liquidienne importante. Traitement par l'allergine de Jousset.

Grossesse normale ; scopie de septembre 44 : image de scissurite très nette à la base du lobe supérieur avec autour une zone plus opaque ; cul-de-sac costo-diaphragmatique se déplissant mal ; aucune image évolutive ; à G. : I. T. N.

Le 25 décembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 2.640, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2615. — B... S., 32 ans, I-pare.

1928 : Petite hémoptysie, B. K. : 0.
1933 : B. K. + pendant 5 mois.
1939 : Pleurésie G.
1940 : Séjour en sana.

Grossesse normale ; scopie de juillet 44 : hile G. chargé, sommet G. s'éclairant mal à la toux.

Le 26 décembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.800, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Année 1945

Obs. N° 109. — B... T., 26 ans, II-pare.

1° 1940 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
Avril 42 : Lésion du sommet D., B. K. +.
Mai 42 : PNO D., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale ; scopie d'octobre 44 : à D., image de PNO, moignon bien collabé sans image évolutive, légère réaction liquidienne.

Le 15 janvier 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.800, B. C. G.; D. A. pour non décollement et hémorragie ; S. de C. fébriles mais abcès cuisse D.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 141. — L... R., 22 ans, I-pare.
Septembre 42 : Infiltration du sommet G.
Décembre 42 : Poussée évolutive avec extension des lésions et B. K. +.
Janvier 43 : PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 19 janvier 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.800, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles du 3e au 8e jour.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 241. — F... D., 22 ans, I-pare.
Avril 41 : Lésions juxta-hilaires D., B. K. + ; PNO D. suivi d'une section de brides en octobre ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 31 janvier 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.850 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon, PNO D., interrompu en octobre 45.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 273. — P... C., 32 ans, I-pare.
1933 : Lésion G., B. K. +; PNO G.; B. K. : 0.
1938 : Arrêt du PNO ; depuis, radio négative.
Grossesse normale au point de vue pulmonaire ; albuminurie et hypertension au 8e mois.
Le 4 février 45 : Acc. à T. : travail pénible (65 h. 30), enfant 3.440, décédé au cours du travail ; forceps.
Hémorragie importante de la délivrance, shock, D. A.; transfusion ; S. de C. fébriles, lochies fétides.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.

Obs. N° 287. — A... Y., 31 ans, I-pare.
Août 34 : Hémoptysie, lésion D.; séjour en sana.
Mars 35 : Lésion G., B. K. +; PNO G., entretenu jusqu'en 1944 ; B. K. : 0.
1943 : Soupçonnée de tuberculose rénale, mais sondages toujours négatifs.
Grossesse bien supportée malgré cystite.
Le 6 février 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.410 ; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Avortement de 2 mois en octobre 45, suivi de curettage.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 338. — C... L., 24 ans, III-pare.
1° 1941 : Acc. N. à 8 mois ; D. N.; S. de C. N.
2° Mai 42 : Forceps à 8 mois ; D. N.; S. de C. N.
Novembre 42 : Hémoptysie, spélonque du sommet G., B. K. +.

Décembre 42 : PNO G., suivi d'une section de brides en janvier 43 ; B. K. : 0.
Mars 43 : Réaction liquidienne importante ; arrêt du PNO.
Grossesse normale.
Le 12 fevrier 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.600 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 354. — L... D., 23 ans, I-pare.
Janvier 43 : Infiltration sous-claviculaire G., B. K. +.
Novembre 43 : PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 14 février 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.600, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 379. — M... J., 34 ans, I-pare.
Lésion au sommet D. en 1927 ; séjour en sana pendant 18 mois.
Février 44 : Rechute avec B. K. +; aucun changement radiologique.
B. K. 0 depuis décembre 44.
Grossesse normale.
Le 16 février 45 : A T., forceps pour souffrance fœtale : garçon, 2.500, mort-né ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.

Obs. N° 724. — R... G., 22 ans, I-pare.
Janvier 44 : Lésion du sommet G., B. K +; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse bien supportée.
Au 5e mois de la grossesse, prise de sang : B. W. + +; traitement par novar et bivatol.
Le 5 avril 45 : Forceps pour fatigue maternelle : garçon, 3.550 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 737. — G... C., 32 ans, II-pare.
1° 1942 : Acc. N. à T. : 3.500, bpt ; D. N.; S. de C. N.
Mars 41 : Lésion du sommet G., B. K. +.
Avril 41 : PNO G.; B. K. : 0.
Grossesse normale ainsi que la précédente.
Le 7 avril 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.750, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon, PNO G. arrêté depuis avril 46.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 774. — A... M., 31 ans, III-pare.
1° 1933 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
2° 1939 : Acc. gémellaire ; D. N.; S. de C. N.
1942 : Caverne sous-claviculaire G., nodules à D., B. K. +; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 12 avril 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 865. — B... A.-M., 30 ans, II-pare.
1° 1939 : Acc. prématuré à 7 mois 1/2 par le siège ; D. N.; S. de C. N.
Mars 42 : 2 hémoptysies, taches aux 2 sommets, B. K. +; PNO D., entretenu de septembre 42 à juillet 44 ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 23 avril 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 866. — D... M., 34 ans, II-pare.
1° 1930 : Acc. par le siège ; D. N.; S. de C. N.
1942 : Lésion G.; B. K. +; PNO G.; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 23 avril 45 : Forceps à dilatation complète : fille, 2.660, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon, PNO arrêté en juin 46.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 883. — L... A.-M., 28 ans, III-geste, II-pare.
1° 1938 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
2° 1943 : Avortement de 1 mois 1/2 ; suites normales.
1932 : Pleurésie séro-fibrineuse D.
1935 : Rechute, taches au sommet D.; séjour en sana pendant 1 an.
1940 : Rechute, hémoptysie, B. K. +, lésion G.; PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
1941 : Fistule anale ; tentatives infructueuses de PNO D. pour caverne du sommet D.
1942 : Phrénicectomie D.
Grossesse normale ainsi que la précédente et l'avortement.
Le 25 avril 45 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : garçon, 2.800, B. C. G.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : stationnaire.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 955. — R... Y., 34 ans, II-geste, I-pare.

1° 1932 : Avortement de 2 mois suivi de curettage.
Juin 43 : Caverne du sommet G., B. K. +.
Juillet 43 : PNO G.; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 3 mai 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.200 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Au début de 1946 : B. K. + avec état général médiocre ; le PNO G., fortement symphysé, se recolle peu à peu. Actuellement, le poumon G. est peu homogène, sans image certaine de caverne.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 960. — M... M., 31 ans, III-geste, II-pare.

1° 1938 : Forceps à T. : 3.500, bpt ; D. N.; S. de C. fébriles.
2° 1944 : Avortement provoqué de 1 mois 1/2 suivi de curettage.
1933 : Pleurésie avec hémoptysie ; séjour en sana ; sels d'or.
1939 : Hémoptysie, lésion G., B. K. +; PNO G., entretenu pendant 18 mois.
Mai 41 : Thoracoplastie G.; B. K. 0 depuis.
1re grossesse et avortement sans influence sur l'état pulmonaire.
Evolution normale de la dernière grossesse au point de vue pulmonaire ; au 8e mois : albuminurie avec œdème très important des membres inférieurs.
Le 3 mai 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.200, B. C. G.; hémorragie de 1.100 gr. après D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : à G., thoracoplastie efficace ; à D., image sensiblement normale.
Etat actuel de l'enfant : fragile, retard important pour la marche.

Obs. N° 992. — L... D., 24 ans, I-pare.

Août 44 : Caverne au poumon D., B. K. +; PNO D., suivi de 2 sections de brides; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 7 mai 45 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : garçon, 2.850 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant, PNO D. arrêté en juillet 46.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1036. — C... G., 33 ans, II-pare.

1° 1939 : Acc. N. à T. : 3.430, bpt ; D. N.; S. de C. N.
Juillet 44 : Caverne sous-claviculaire D.
Octobre 44 : PNO D., suivi d'une section de brides.
Grossesse normale.
Le 13 mai 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.600, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : très satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1055. — C... A., 36 ans, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 27, 30 et 39 ; D. N.; S. de C. N.
Novembre 40 : Hémoptysie, B. K. +, lésion intercléido-hilaire G.
Janvier 41 : PNO G., entretenu depuis.
B. K. 0 depuis décembre 42.
Grossesse normale.
Le 15 mai 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1085. — T... J., 23 ans, I-pare.

1941 : tache au poumon D.
Séjour en sana pendant 14 mois.
Grossesse normale.
Le 19 mai 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1128. — G... M.-Th., 22 ans, I-pare.

1938 : Caverne du lobe supérieur D., B. K. +, petites taches au sommet G.; PNO D., suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 24 mai 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.770 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon ; PNO D., arrêté en mars 46.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1131. — R... M., 33 ans, II-geste, I-pare.

1° 1942 : Avortement de 1 mois 1/2 ; suites normales.
1925 : Hémoptysie, B. K. +, lésion au poumon D.
1926 : PNO D.
1928 : Réaction liquidienne qui se résorbe.
1930 : Arrêt du PNO D.; B. K. : 0.
Aucun incident depuis ; grossesse normale.
Le 25 mai 45 : Acc. N. à T. : garçon, 4.220, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1162. — D... S., 33 ans, III-geste, II-pare.

1° 1942 : Acc. par le siège : 2.950, bpt ; D. N.; S. de C. N.
2° juillet 43 : Avortement de 2 mois ; suites normales.
1934 : Hémoptysie, caverne du sommet D.; B. K. toujours 0.
Traitement par repos et sels d'or.
Grossesse normale ainsi que la précédente et l'avortement.
Le 30 mai 45 : Acc. à 6 mois 1/2 d'une grossesse triple.

1 fille 1.180, 2 garçons 1.100 et 1.220, décédés 4 heures après la naissance; D. A.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.

Obs. N° 1363. — L... G., 43 ans, III-pare.
2 acc. N. à T. en 1925 et 28 ; D. N.; S. de C. N.
1935 : Hémoptysie, caverne du sommet D., B. K. +; PNO D., interrompu 1 an après pour symphyse ; B. K. : 0.
Grossesse normale ; scopie de mai 45 : petits nodules calcifiés à D.
Le 25 juin 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.010, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1649. — T... H., 29 ans, V-geste, IV-pare.
3 acc. N. à T. en 1936, 41 et 43 ; D. N.; S. de C. N.
1 avortement provoqué en 1939 ; suites normales.
Bronchite chronique depuis 1941.
Voile au poumon D. en 1944.
Grossesse normale.
Le 3 août 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.380, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1720. — L... M., 32 ans, IV-pare.
3 acc. N. à T. en 1936, 38 et 39 ; D. N.; S. de C. N.
1934 : Voile du sommet G.; séjour en sana pendant 1 an.
Grossesse normale ainsi que les précédentes.
Le 10 août 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.330, B. C. G.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1726. — B... J., 31 ans, I-pare.
1932 : Lésion du sommet G.; PNO G., entretenu pendant 8 mois ; séjour en sana pendant 16 mois.
Grossesse normale.
Le 11 août 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.850 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1775. — G... R., 31 ans, I-pare.
1939 : Pleurésie D.
Septembre 42 : Lésions discrètes des deux sommets ; séjour en sana.
Octobre 43 : Arthrite vertébrale (lombaire) ; plâtre pendant 6 mois.

Grossesse normale au point de vue pulmonaire ; albuminurie pendant le dernier mois ; 2 crises d'éclampsie pendant le travail.
Le 17 août 45 : Forceps après incision du col : garçon, 3.150, B. C. G.; D. A.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1777. — L... S., 18 ans, I-pare.
Octobre 43 : Caverne du sommet D., B. K. +.
Décembre 43 : PNO D., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 18 août 45 : Acc. prématuré à 6 mois 1/2 : fille, 1.320, décédée 2 heures après la naissance ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
A accouché de nouveau, après une grossesse normale, le 14 juillet 46.

Obs. N° 1842. — A... A., 36 ans, II-pare.
1° 1932 : Acc. N. à T. : 3.400, bpt ; D. N.; S. de C. N.
1943 : Lésion sous-claviculaire G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 25 août 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.580 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1856. — L... D., 37 ans, II-pare.
Pour les antécédents, voir obs. n° 508, année 1944.
Grossesse normale.
Le 27 août 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.030, décédée à 15 jours de gastro-entérite ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.

Obs. N° 1934. — M... O., 40 ans, III-pare.
En 1928 et 34 : Césarienne pour bassin G. R.; S. de C. N.
1923 : Hémoptysie, voile au poumon D.; repos.
Grossesse normale ainsi que les précédentes.
Le 6 septembre 45 : Césarienne pour bassin G. R : fille, 3.300 ; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1967. — S... A., 22 ans, I-pare.
Mars 38 : Caverne du sommet D., B. K. +; PNO D., entretenu jusqu'en juin 40 ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 11 septembre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2089. — E... J., 22 ans, I-pare.

1937 : Voile au poumon G.; repos pendant 1 an.

Grossesse normale.

Le 25 septembre 45 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.710 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : R. à S. au point de vue pulmonaire ; poussée de salpingite.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2145. — B... J., 33 ans, I-pare.

1939 : Cavernes ulcérées du sommet D., B. K. +; PNO D., entretenu depuis, suivi d'une section de brides.

1940 : Accentuation des ombres péri-hilaires G. et constitution d'une cavité para-hilaire ; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 2 octobre 45 : Forceps après incisions du col pour arrêt de la dilatation : garçon, 3.550, décédé le 4e jour d'hémorragie méningée ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Obs. N° 2238. — R... L., 31 ans, II-pare.

1er 1938 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

1943 : Hémoptysie, caverne sous-claviculaire G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 13 octobre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.670, décédée à 15 jours de gastro-entérite ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : très satisfaisant.

Obs. N° 2341. — D... R., 29 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en janvier 39 et mai 42 ; D. N.; S. de C. N.

Juillet 39 : tache au sommet G., B. K. +.

Septembre 39 : Caverne du sommet G.; PNO G., suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Septembre 44 : Arrêt du PNO G.

Grossesse normale, ainsi que la précédente.

Le 24 octobre 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.720, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2390. — M... A., 20 ans, I-pare.
1944 : Pneumonie G., puis voile du sommet G.; B. K. +; PNO G., entretenu depuis, B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 30 octobre 45 : Acc. à T. par le siège : fille, 3.120, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2449. — J... R., 36 ans, II-pare.
1° 1942 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
1928 : Lésion D., B. K. +; traitement par sels d'or.
Séjour en sana pendant 18 mois ; B. K. : 0.
Rechute fin 32 : lésion G., B. K. +.
Séjour en sana de 1932 à 1937.
1937 : PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale ainsi que la précédente.
Le 7 novembre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.100 ; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2463. — L... R., 35 ans, IV-geste, II-pare.
2 avortements de 3 mois en 1938 et 39, le 1er suivi de curettage.
1940 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
Décembre 36 : Lobite supérieure D., B. K. +.
Mars 37 : PNO D., entretenu jusqu'en juillet 38 ; B. K. : 0.
Grossesses et avortements sans influence sur l'état pulmonaire.
Le 8 novembre 45 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : garçon, 2.320 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2478. — C... Y., 18 ans, I-pare.
1941 : Poumon D. voilé.
Séjour en sana pendant 1 an.
Grossesse normale.
Le 10 novembre 45 : Acc. N. à 8 mois : fille, 1750 ; D. N. ; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : taches au poumon D. en octobre 46.
Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 2527. — M... C., 39 ans, I-pare.
1921 : Hémoptysie, lésion G.

Séjour en sana ; bonne cicatrisation.
Grossesse normale.
Le 16 novembre 45 : Forceps pour non progression : garçon, 3.420 ; R. U. pour hémorragie ; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2568. — M... L., 27 ans, I-pare.
A l'âge de 20 ans, séjour en sana pour lésion pulmonaire D., s'étant nettoyée en 6 mois.
Grossesse normale.
Le 21 novembre 45 : Forceps pour non progression : garçon, 3.310 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2764. — M... L., 28 ans, I-pare.
1922 : Pleurite sèche et adénopathie hilaire.
Séjour en sana pendant 14 mois.
1925 : Mal de Pott soigné à Berck pendant 5 ans.
Octobre 42 : Tractus sous-claviculaires D., B. K. +.
Décembre 42 : PNO D. ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 15 décembre 45 : Forceps après incisions du col pour arrêt de la dilatation : garçon, 3.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

FEMMES NON RETROUVÉES

Année 1944

Obs. N° 200. — M... C., 24 ans, III-geste, II-pare.
1° 1939 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
2° Février 42 : Avortement de 2 mois 1/2 ; suites normales.
Novembre 42 : Taches au poumon G., B. K. +.
Séjour en sana ; B. K. : 0 ; guérison.
Grossesse normale.
Le 27 janvier 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.830, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 461. — U... J., 32 ans, V-pare.
4 acc. N. à T. en 1933, 34, 39 et 40 ; D. N.; S. de C. N.
Décembre 42 : Hémoptysie, image parenchymateuse du sommet D., B. K. +.
Séjour en sana ; B. K. : 0.

Grossesse normale ; scopie de novembre 44 : diminution modérée de transparence du sommet G., plus accentuée à D.; petite tache sous-claviculaire D.

Le 29 février 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.100 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 619. — M... A., 26 ans, III-geste, I-pare.

2 avortements provoqués en 1939 et 41 ; suites normales.

1937 : Lésion D., B. K. + ; PNO D., entretenu pendant 2 ans B. K. : 0.

Aucune influence des avortements sur l'état pulmonaire.

Grossesse normale.

Le 21 mars 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.500 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 721. — K... L., 30 ans, III-pare.

2 acc. N. en 1940 et 42 ; D. N.; S. de C. N.

Juin 39 : Caverne du lobe moyen D., B. K. + ; PNO D., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que les précédentes.

Le 2 avril 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.850 ; D. N.; Shock après la délivrance (hémorragie) ; S. de C. N.

Obs. N° 793. — B... S., 30 ans, IV-geste, II-pare.

1937 : Acc. N. à T. : 3.750, bpt ; D. N.; S. de C. N.

2 avortements provoqués en 1938 et 39, le 2e suivi de salpingite.

1940 : Broncho-pneumonie bilatérale, suivie d'une caverne du sommet G. ; B. K. + pendant 2 ans ; PNO G., suivi d'une section de brides ; réaction liquidienne 6 mois après ; arrêt du PNO G. en août 43.

Grossesse normale.

Le 11 avril 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.970, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 894 bis. — B... M., 40 ans, I-pare.

1928 : Congestion pulmonaire.

1933 : Lésion G.; PNO G., entretenu jusqu'en 1938.

Grossesse normale.

Le 24 avril 44 : Césarienne pour bassin G. R. : fille, 2.900 ; S. de C. N.

Obs. N° 997. — V... M., 36 ans, I-pare.

1931 : Lésion du sommet G., B. K. +.

Séjour en sana pendant 8 mois ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 9 mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.350 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1008. — B... A., 23 ans, I-pare.

Juillet 42 : Infiltration non homogène des 2 sommets, tendance hémoptoïque, B. K. +.

Séjour en sana ; B. K. : 0 depuis septembre 43.

Grossesse normale.

Le 10 mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1032. — C... A., 34 ans, V-pare.

4 acc. N. à T. en 1928, 33, 39 et 40 ; D. N.; S. de C. N.

1942 : Lésions D., B. K. + ; PNO D., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 13 mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.900 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1045. — R... J., 36 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1936 et 37 ; D. N.; S. de C. N.

1926 : Lésion du sommet D., B. K. + ; PNO D., entretenu pendant 1 an; B. K. : 0.

1933 : Rechute ; lésion D.; B. K. +.

1935 : Phrénicectomie D.; B. K. 0 depuis.

Grossesse normale ainsi que les précédentes.

Le 15 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 4.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1067. — L... J., 27 ans, I-pare.

A l'âge de 15 ans : bronchite à la suite de laquelle on trouve à la radio des lésions parenchymateuses D.; PNO D., entretenu pendant 11 mois : guérison.

Grossesse normale.

Le 19 mai 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : garçon, 2.670, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1105. — R... S., 27 ans, II-pare.

1° 1942 : Acc. N. à T. : 3.450, bpt ; D. N.; S. de C. N.

1940 : Caverne du sommet G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 22 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.850 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1117. — C... P., 26 ans, II-pare.

1° 1941 : Acc. N. à T. : 3.250, bpt ; D. N.; S. de C. N.

Janvier 1937 : Hémoptysie, lésion évolutive du sommet D., B. K. +.

Février 37 : PNO D., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Août 39 : Episode fébrile avec hémoptysie, B. K. +, lésion évolutive du sommet G.; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 25 mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1143. — C... A., 25 ans, II-pare.

1° 1941 : Ablation, pour torsion, d'un kyste de l'ovaire D. au 6e mois de la grossesse. Acc. prématuré ; D. N.; S. de C. N.

1940 : Lésion ulcéro-caséeuse du sommet G., B. K. +; tentatives infructueuses de PNO G.

Séjour en sana pendant 1 an ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 29 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.910, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1150. — L... D., 24 ans, II-geste, I-pare.

1° 1942 : Avortement de 6 semaines ; suites normales.

Mai 36 : Hémoptysie, lésion du sommet G., B. K. +.

Juillet 36 : PNO G.; B. K. : 0.

1938 : Infiltration D., B. K. +.

1939 : Nouvelle petite lésion G., B. K. +; section de brides en octobre 39.

Séjour en sana de 1938 à juillet 41 ; B. K. : 0.

Arrêt du PNO G. en décembre 41.

Avortement de 1942 sans influence sur l'état pulmonaire.

Avril 43 : Hémoptysie de grande abondance suivie dans les jours ultérieurs de quelques crachats sanglants.

Grossesse normale ; scopie de novembre 43 : grisaille des 2 sommets.

Le 30 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 4.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1249. — M... R., 27 ans, II-pare.

1° 1939 : Acc. N. à T. : 3.500, bpt ; D. N.; S. de C. N.

A l'âge de 9 ans : réaction ganglionnaire hilaire (à la graphie).

1938 : Hémoptysies fréquentes ; lésion G.; B. K. toujours 0.

Repos en montagne ; cessation des hémoptysies ; bon état général.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 13 juin 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.950, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1288. — P... C., 20 ans, I-pare.

1942 : Lésion au poumon D., B. K. + ; PNO D. entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale au point de vue pulmonaire ; albuminurie et légère hypertension artérielle.

Le 18 juin 44 : Forceps à dilatation complète : fille, 3.300, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1534. — B... M., 21 ans, I-pare.

Pleurésie D. à l'âge de 7 ans.

1940 : Hémoptysie, voile des 2 sommets, B. K. 0.

1942 : Hémoptysie, image ulcéro-fibreuse du poumon D., B. K. +; tentatives infructueuses de PNO D.

Grossesse normale ; bon état général ; B. K. 0.

Le 23 juillet 44 : Acc. N. à T. : garçon, 2.900 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1595. — C... M.-L., 24 ans, I-pare.

Séjour de 18 mois en camp de concentration (1941-1942).

1942 : Lésion au poumon G.; PNO G. suivi d'une section de brides, et interrompu au bout de 3 mois pour réaction liquidienne importante.

Grossesse normale.

Le 31 juillet 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.700 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

A accouché de nouveau en août 45 (voir année 1945, obs. n° 1732).

Obs. N° 2157. — A... O., 23 ans, I-pare.
1942 : Hémoptysie de moyenne abondance, lésion du sommet G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 24 octobre 44 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.450 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2416. — T... M., 21 ans, I-pare.
Octobre 43 : Lésion G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. ; 0.
Grossesse normale.
Le 29 novembre 44 : Acc. N. à 7 mois 1/2 : garçon, 2.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2531. — A... G., 33 ans, V-pare.
4 acc. N. en 1930, 35, 36 et 40 ; D. N.; S. de C. N.
Janvier 43 : Hémoptysies, tache au sommet D.; pas de traitement.
Septembre 43 : Spélonque sous-claviculaire D. et infiltration nette au niveau de la partie inférieure du lobe moyen D., B. K. +; PNO D., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 15 décembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.750, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2629. — C... A., 27 ans, IV-geste, II-pare.
1938 : Acc. N. à T. : 3.710, bpt ; D. N.; S. de C. N.
2 avortements en 1939 et 43, suivis de curettage.
Novembre 40 : Petite cavité du sommet D., B. K. +.
Janvier 41 : PNO D., entretenu depuis ; B. K. : 0.
2e avortement et 2e grossesse sans influence sur l'état pulmonaire.
Le 27 décembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.620, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Année 1945

Obs. N° 44. — E... F., 26 ans, I-pare.
1940 : Lésion sous-claviculaire G.
Séjour en sana pendant 1 an.
Grossesse normale.
Le 5 janvier 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.690 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 91. — G... J., 24 ans, II-geste, I-pare.
1° 1944 : Avortement de 3 mois, suivi de curettage.
1939 : Infiltration de la région juxta-hilaire G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Avortement et grossesse sans influence sur l'état pulmonaire.
Le 12 janvier 45 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.550, décédé le 7e jour ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 182. — C... P., 31 ans, I-pare.
1933 : Hémoptysie.

3 mois après : pleurésie séro-fibrineuse D.
B. K. toujours 0.
Grossesse normale.
Le 25 janvier 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.900, mort-né (hépato-splénomégalie) ; D. N. (placenta infarci) ; S. de C. N.

Obs. N° 402. — A... J., 23 ans, II-geste, I-pare.
1° 1943 : Avortement de 2 mois, suivi de curage digital.
1935 : Lésion du sommet G. ; PNO G.; 3 mois après : réaction liquidienne qui a été ponctionnée à plusieurs reprises (liquide purulent) ; PNO G., entretenu jusqu'en avril 37 ; séjour en sana pendant 7 ans ; B. K. toujours 0.
Grossesse normale après un léger amaigrissement au début.
Le 20 février 45 : Forceps pour lenteur de l'expulsion : garçon, 2.920 ; B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 408. — B... Y., 20 ans, I-pare.
1940 : Spélonque du sommet G., B. K. +; PNO G., entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 21 février 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.070, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 477. — P... M., 43 ans, VI-geste, V-pare.
4 acc. N. à T. en 1924, 31, 36 et 37 ; D. N.; S. de C. N.
1 avortement de 6 semaines en 1935 ; suites normales.
1938 : Tuberculose apicale D., B. K. +; PNO D., entretenu pendant 14 mois ; B. K. : 0.
Mai 42 : Rechute avec hémoptysie, B. K. +; traitement par repos ; calcium, sels d'or ; B. K. 0 depuis octobre 42.
Grossesse normale.
Le 1er mars 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.080 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 690. — C... A., 21 ans, I-pare.
Juillet 44 : Toux, expectoration (B. K. 0), amaigrissement important (8 kgr.) ; cuti + +; reliquat de primo-infection.
Séjour en préventorium pendant 4 mois ; amélioration de l'état général.
Grossesse normale.
Le 30 mars 45 : Acc. N. à T. : garçon, 4.000 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 786. — B... R., 30 ans, II-geste, I-pare.
1° 1935 : Avortement de 4 mois ; suites normales.
1937 : Hémoptysie, B. K. + pendant 3 mois ; séjour en sana.
1941 : Hémoptysie, B. K. +, lésion G.; PNO G., entretenu depuis.
1942 : Lésion D.; PNO D., entretenu depuis ; B. K. 0 depuis avril 42.
Grossesse normale.
Le 13 avril 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.250, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 928. — B... R., 26 ans, II-pare.
1° 1941 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

1940 : Petite lésion apicale G., B. K. 0 ; repos, guérison.
Février 43 : 3 petites hémoptysies, B. K. +, caverne D., lésion apicale G.
Juin 43 : PNO bilatéral.
Octobre 44 : Arrêt du PNO G.
Grossesse normale ainsi que la précédente.
Le 29 avril 45 : Césarienne suivie d'hystérectomie pour anomalies de dilatation.
Fille, 3.310, décédée le 8e jour ; S. de C. fébriles.

Obs. N° 944. — B... C., 28 ans, I-pare.
1935 : Lésion sous-claviculaire D., B. K. +; PNO D.; B. K. : 0.
1938 : Caverne sous-claviculaire G., B. K. +; PNO G.; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 1er mai 45 : Forceps pour non progression : fille, 2.750 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1268. — M... J., 27 ans, I-pare.
1932 : Congestion pulmonaire avec pleurite G.
1933 : Lésions G., voile à D., B. K. +; tentative infructueuse de PNO G.; séjour en sana ; sels d'or ; B. K. : 0.
1938 : Rechute avec B. K. +; sels d'or.
1944 : PNO G. extra-pleural ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 13 juin 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.600 ; R. U. pour placenta incomplet ; S. de C. N.

Obs. N° 1309. — M... R., 27 ans, I-pare.
1936 : Petite lésion G.; repos.
Grossesse normale.
Le 19 juin 45 : Acc. à T. par le siège : garçon, 3.700 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 1315. — R... J., 36 ans, III-pare.
En 1941 et 43 : Forceps à T.; D. N.; S. de C. N.
1936 : Hémoptysie, lésion du sommet G., B. K. + ; PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale ainsi que les précédentes.
Le 20 juin 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1349. — M... S., 24 ans, I-pare.
A l'âge de 3 ans : lésion au poumon G.; séjour en préventorium.
Actuellement, lésion calcifiée.
Grossesse normale au point de vue pulmonaire ; salpingite aiguë pendant les 4 premiers mois.
Le 24 juin 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.330 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1368. — D... M., 37 ans, II-pare.
1° 1932 : Acc. N. à T. : 3.500, bpt ; D. N.; S. de C. N.

A l'âge de 18 ans : hémoptysie, voile au poumon G.; repos.
Grossesse normale ainsi que la précédente.
Le 26 juin 45 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : garçon, 2.940 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1424. — P... L., 22 ans, I-pare.
1939 : Lésion G.; séjour en sana.
1943 : Caverne du sommet G., B. K. + ; séjour en sana.
Grossesse normale.
Le 2 juillet 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.900, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles les 3 premiers jours puis normales.

Obs. N° 1481. — R... M., 22 ans, I-pare.
Juillet 42 : Taches à G., B. K. +.
Août 43 : PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 11 juillet 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.430, B. C. G.; D. A. pour non décollement ; S. de C. N.

Obs. N° 1495. — D... Y., 23 ans, I-pare.
1942 : Lésion au poumon D.; repos.
Grossesse normale.
Le 13 juillet 45 : Acc. à T. par le siège : fille, 2.980, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 1659. — C... C., 29 ans, II-pare.
1° 1940 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
A l'âge de 13 ans : hémoptysie ; 2 ans de préventorium.
A l'âge de 21 ans : pneumonie double.
Grossesse normale ainsi que la précédente.
Le 4 août 45 : Acc. N. à T. : fille (pied bot D.), 3.750, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1667. — J... O., 21 ans, I-pare.
Octobre 42 : Lésion G. excavée, B. K. + ; PNO G., entretenu depuis ; B. K. 0.
Grossesse normale.
Le 5 août 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.970 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1732. — C... M.-L., 25 ans, II-pare.
Pour les antécédents, voir l'obs. n° 1595, année 1944.
Grossesse normale.
Le 12 août 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.900, décédée le 28e jour ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1920. — G... O., 20 ans, I-pare.
1935 : poumons voilés ; séjour en préventorium.
Grossesse normale.
Le 4 septembre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.770 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1944. — D... O., 32 ans, II-pare.

1° Février 44 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Mars 42 : Voile au poumon D.; traitement par sels d'or.

Novembre 42 : Lésion D.; tentatives infructueuses de PNO D.; B. K. toujours 0.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 7 septembre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 4.050, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2051. — R... D., 21 ans, I-pare.

Mai 44 : Lésion au poumon G., B. K. +.

Juin 44 : PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 20 septembre 45 : Forceps à dilatation complète : garçon, 3.450, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles les premiers jours.

Obs. N° 2071. — N... R., 36 ans, II-pare.

1° 1935 : Acc. N. à T.; R. U. pour placenta incomplet.

A l'âge de 12 ans : lésion D.; séjour en sana pendant 2 ans ; B. K. toujours 0.

Grossesse normale.

Le 22 septembre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.550, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2101. — C... M., 22 ans, I-pare.

A l'âge de 9 ans : poumon G. voilé ; séjour en préventorium.

Grossesse normale.

Le 26 septembre 45 : Césarienne pour bassin G. R. : garçon, 2.830 ; S. de C. subfébriles les premiers jours.

Obs. N° 2117. — C... G., 33 ans, II-geste, I-pare.

1° 1944 : Avortement de 2 mois ; suites normales.

1939 : Hémoptysie, caverne du sommet G., B. K. +; PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que l'avortement.

Le 28 septembre 45 : Acc. à T. par le siège : fille, 3.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2166. — T... B., 34 ans, II-geste, I-pare.

1° 1941 : Avortement de 3 mois 1/2 ; suites normales.

1935 : Caverne du sommet D., lésions disséminées à G., B. K. +; PNO D. suivi d'une section de brides ; puis, phrénicectomie D. (les insufflations devenant plus difficiles) ; B. K. : 0.

1937 : Arrêt du PNO D.

Grossesse normale ainsi que l'avortement au point de vue pulmonaire.

Le 4 octobre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.520, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2199. — G... A., 20 ans, I-pare.

A l'âge de 8 ans : adénopathie trachéo-bronchique.

A l'âge de 12 ans : voile au poumon G.; séjour en préventorium pendant 28 mois.
Grossesse normale.
Le 8 octobre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.700 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2226. — R... L., 21 ans, I-pare.
1938 : Séjour en sana pendant 1 an pour accidents pulmonaires légers ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 11 octobre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.480 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2270. — G... G., 19 ans, I-pare.
Décembre 41 : Pleurésie D. vérifiée par ponction.
Avril 43 : 2 petites taches au-dessus de la clavicule G.; séjour en sana.
Grossesse normale.
Le 16 octobre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.090 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2273. — D. S., 24 ans, I-pare.
Octobre 37 : Petite hémoptysie, caverne au poumon G., taches à D., B. K. +.
Novembre 37 : PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 16 octobre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.350, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2401. — N... P., 20 ans, I-pare.
Novembre 43 : Caverne du sommet D., B. K. +.
Décembre 43 : PNO D., entretenu depuis.
Janvier 44 : Section de brides ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 1er novembre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.000 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2447. — S... C., 18 ans, I-pare.
1943 : Lésion au poumon G.; PNO G., entretenu depuis.
Grossesse normale.
Le 7 novembre 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.400 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2743. — M... A., 25 ans, I-pare.
1941 : Infiltration du sommet G., B. K. +; PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Le 12 décembre 45 : Forceps à dilatation complète : garçon, 3.040 ; D. A. pour non décollement ; S. de C. subfébriles.

TUBERCULOSES COMPLIQUÉES PENDANT LA GROSSESSE

Nombre d'observations : 39.

Parité par rapport à la tuberculose au moment de la grossesse compliquée :

Primipares : 32
Multipares : 7.

Ancienneté de la tuberculose par rapport à la grossesse compliquée :

Moins de 1 an : 10
Entre 1 et 2 ans : 4
Entre 2 et 3 ans : 2
Entre 3 et 4 ans : 5
Entre 4 et 5 ans : 3
Plus de 5 ans : 15.

Forme de la tuberculose :

Tuberculose fibro-caséeuse : 27
Tuberculose fibreuse : 6
Tuberculose pleurale : 6.

Moment de la complication :

1er mois : 1
2e mois : 4
3e mois : 5
4e mois : 2
5e mois : 2
6e mois : 4
7e mois : 4
8e mois : 2
Non précisé : 15.

Forme de la complication :

Etat général touché : 3
Signes fonctionnels : 2
B. K. + : 8

Hémoptysies : 5
Aggravation des lésions : 9
Bilatéralisation des lésions : 7
Réaction liquidienne : 3
Pleurésie : 1
Tuberculose rénale : 1.

Accouchement :

Acc. N. : 36
Forceps : 3
Application systématique : 1
Pour fatigue maternelle : 1
Après incisions du col : 1.

Délivrance :

D. N. : 37
R. U. : 2.

S. de C. immédiates :

S. de C. N. : 20
S. de C. subfébriles : 8
S. de C. fébriles : 9
Décès : 2.

26 femmes sur 37 ont pu être retrouvées.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'accouchement :

Etat satisfaisant : 15
Complications : 7
Complication mécanique du PNO : 1
Aggravation des lésions : 2
Réaction liquidienne : 1
Hémoptysie : 1
Etat général touché : 2
Décès : 4

Etat pulmonaire actuel :

Etat satisfaisant : 13
Etat stationnaire : 5
Etat aggravé : 3
Décès : 1.

Grossesses ultérieures :

1 femme a eu 1 grossesse ultérieure compliquée d'hémoptysie comme la 1re.
1 femme a eu 5 grossesses ultérieures sans complication.
2 femmes ont eu 1 grossesse ultérieure sans complication.

En conclusion, on voit que les complications surviennent plus fréquemment chez les primipares que chez les multipares ; par contre, l'ancienneté de la tuberculose par rapport à la grossesse joue un rôle plus discutable. Elles se voient principalement dans les formes fibro-caséeuses ; apparaissent à n'importe quel moment de la grossesse et se manifestent le plus souvent par la reprise de l'évolution de lésions anciennes ou en voie de cicatrisation, ou par l'apparition de nouvelles taches. Enfin, les 39 cas cités peuvent se diviser en 15 complications légères et 24 complications graves.

FEMMES RETROUVÉES

Année 1944

Obs. N° 34. — B... A., 36 ans, I-pare.

Grippe en 1937. Dans la suite, un examen radiologique montre une cavité au poumon D.; PNO D. entretenu depuis ; petite réaction liquidienne.

Pendant la grossesse : amaigrissement ++, grande fatigue.

Le 6 janvier 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.850, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles avec irrégularités thermiques pendant les 5 premiers jours sans cause locale décelable.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : fragile, n'a marché qu'à 25 mois.

Obs. N° 559. — M... R., 30 ans, VI-geste, V-pare.

4 grossesses en 1933, 36, 38 et 40 ; D. N.; S. de C. N.

1 avortement de 3 mois suivi de curettage en 1934.

1929 : Lésion au poumon D.; aucun traitement.

1933 : B. K. + pendant la première grossesse ; B. K. 0 depuis.

1936 : Séjour en sana pendant 10 mois ; apparition d'une tumeur blanche au genou D.; plâtre.

Grossesse normale.

Le 13 mars 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.400 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 865. — L... S., 23 ans, I-pare.

Juillet 40 : Hémoptysie, lésion D., B. K. +.

Septembre 40 : PNO D. entretenu depuis ; B. K. : 0.

Au premier mois de la grossesse : épisode pulmonaire aigu avec B. K. + ; lésion G.; PNO G. entretenu depuis.

Le 20 avril 44 : Acc. à T. par le siège : garçon, 3.750, mort-né avec malformations (double pied bot, atrophie des membres inférieurs, ascite); D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Obs. N° 919. — C... G., 35 ans, I-pare.

Pneumonie du sommet D. à l'âge de 9 ans.
1935 : Hémoptysie, taches sous-axillaires des 2 sommets, B. K. +.
Cure libre ; B. K. 0 ; radio nettoyée.
Fin 37 : Rechute ; cure libre jusqu'en 1939.
Juillet 41 : Pleurésie G. vérifiée par ponction ; cure libre jusqu'en février 42.
D. R. : 16-18 juin 43.
Juillet 43 : Crachats hémoptoïques, B. K. +.
Octobre 43 : Caverne du sommet D.; tentative de PNO D. : pas de décollement.
Décembre 43 : PNO D. extra-pleural.
Le 29 avril 44 : Forceps après incisions du col pour non progression de la dilatation et fatigue maternelle : fille, 3.650, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles les premiers jours.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : fatigue pendant 3 mois ; la poche de l'extra-pleural s'est étirée, d'où danger de recollement : on a rempli progressivement l'extra-pleural avec de l'huile goménolée ; quelques nouvelles taches à G.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 944. — Y... P., 21 ans, I-pare.

Février 43 : Petit épisode infectieux avec état subfébrile, toux, crachats hémoptoïques, laryngite.
Mars 43 : angine.
Avril 44 : Au 8e mois de la grossesse : lésion au poumon D. ; B. K. + ; PNO D.
Le 1er mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.150, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : lésion cicatrisée ; PNO D. toujours insufflé.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 947. — V... J., 24 ans, II-pare.

Juin 41 : Hémoptysie, caverne du sommet D., quelques taches à G., B. K. + ; PNO D. entretenu depuis ; tentatives infructueuses de PNO G. (pneumo-séreuse) ; B. K. : 0.
Février 44 : Au 6e mois de la grossesse : hémoptysie, B. K. 0.
Scopie d'avril 44 : à D. : PNO efficace ; à G. : infiltrat diffus juxta-hilaire et calcification para-trachéale.
Le 1er mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : en novembre 44 : rechute, lésions évolutives à partir des taches anciennes.
Etat pulmonaire actuel : PNO D. toujours insufflé ; PNO G. extra-pleural depuis juillet 46.
Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 1203. — S... C., 26 ans, I-pare.

1939 : Lésion à la base D., B. K. +.

Repos à la campagne jusqu'en 1941 : lésion cicatrisée.

1942 : Episode fébrile, B. K. +; à la radio : cicatrisation parfaite du côté D., lésion G. ; PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.

Au 3e mois de la grossesse : cystite avec B. K. + dans les urines

Le 5 juin 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.800, B. C. G.; R. U. pour placenta incomplet ; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : amaigrissement de 10 kgr., crise de liquide au poumon G.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 1407. — S... H., 30 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1937 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

Février 43 : Apparition d'une fistule anale, opérée en mars 43.

Avril 43 : Image annulaire du bord antérieur du parenchyme pulmonaire se projetant dans la région juxta-hilaire G., B. K. +.

Mai 43 : PNO G.; amélioration de l'état général ; B. K. : 0.

Dès le début de la grossesse : fatigue et amaigrissement ; de la fistule sort un pus d'aspect bacillaire.

Scopie de mai 44 : à G. PNO bien décollé ; léger comblement du sinus costo-diaphragmatique ; à D. : grisaille du sommet qui s'éclaire mal à la toux ; impression de taches opaques non excavées.

Le 4 juillet 44 : Acc. N. à 7 mois : fille, 1.450, décédée le 17e jour ; D. N.; S. de C. fébriles. Evolution rapide et malade décédée le 24 juillet 44.

Obs. N° 1557. — K... L., 35 ans, II-pare.

1° 1929 : Acc. N. à T. : 3.000, bpt ; D. N.; S. de C. N.

1928 : Hémoptysie, lésion G., B. K. +; PNO G. entretenu de 1928 à 1937, abandonné pour réaction liquidienne importante ; B. K. : 0.

Pendant la 1re grossesse : aggravation des lésions.

2e grossesse normale.

Le 26 juillet 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.600, B. C. G.; D. N. ; S. de C. : clochers à 39°4 et à 40° les 6e et 10e jours.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2141. — P. C..., 31 ans, I-pare.

1935 : Petite hémoptysie non fébrile ; B. K. 0 ; pas d'image évolutive à la radio.

1941 : *Idem.*

Au 2e mois de la grossesse : hémoptysie abondante, fébrile ; B. K. +; infiltrat sous-claviculaire D.; tentatives infructueuses de PNO D.

Le 22 octobre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.500, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2262. — C... E., 44 ans, III-pare.

2 grossesses en 1925 et 34 ; D. N.; S. de C. N.

1939 : Laryngite avec B. K. +; aucun traitement.

Au 6e mois de la grossesse : B. K. +, altérations diffuses à fins nodules mais paraissant partiellement scléreuses, plus denses dans le lobe supérieur où elles sont excavatrices. Examen laryngoscopique : larynx sale, végétations interarythénoïdiennes, cordes végétantes et irrégulières.

Le 7 novembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.370, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : stationnaire, B. K. +.

Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 2316. — R... M., 24 ans, II-pare.

1° 1941 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

1939 : Hémoptysie de petite abondance, B. K. 0.

1941 : Pendant la 1re grossesse, hémoptysie.

Au 4e mois de la 2e grossesse : hémoptysie.

Scopie de juin 44 : énorme spélonque superficielle de la base G. ; infiltration diffuse du reste des 2 champs pulmonaires.

Le 16 novembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.420 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : en amélioration.

Etat actuel de l'enfant : bon, mais n'a marché qu'à 2 ans.

Obs. N° 2540. — C... J., 22 ans, I-pare.

1942 : Lésion D., B. K. 0 ; traitement par le gluconate de calcium I. V.

Pendant la grossesse : lésions bilatérales, B. K. +.

Le 16 décembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.800, B .C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : création d'un PNO G. en janvier 45 et d'un PNO D. en mars 45.

Etat pulmonaire actuel : très satisfaisant ; PNO D. arrêté en octobre 46.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2556. — D... S., 23 ans, II-pare.

1° 1943 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Avril 37 : Tuberculose apicale D., B. K. +; tentatives infructueuses de PNO D.

Décembre 37 : Phrénicectomie D.

Mai 38 : Lésion G.; PNO G. qui se décolle bien ; B. K. + avec poussées évolutives jusqu'en fin 39. A partir de 1940 : B. K. 0.

1re grossesse sans influence sur l'état pulmonaire.

En juillet 44, au 3e mois de la 2e grossesse : B. K. +; à la scopie : à G. : image de PNO ayant bien décollé le lobe supérieur ; cicatrice de la grosseur d'une pièce de 50 c. dans le lobe pulmonaire collabé ; le sinus costo-diaphragmatique se déplisse mal ; à D. : infiltration diffuse et non homo-

gène de tout le champ pulmonaire ; le sommet est entièrement bouché et ne s'éclaire pas à la toux ; à la partie moyenne, il semble exister une lésion arrondie avec niveau liquide et se contractant à la toux.

Le 17 décembre 44 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.550, B. C. G. ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : aggravation rapide des lésions et la malade est décédée en mai 45.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 528. — S... A., 29 ans, IV-geste, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1938 et 40 ; D. N.; S. de C. N.

1 avortement de 2 mois en 1941 ; suites normales.

1931 : Lésion au poumon G., B. K. + ; PNO G. entretenu d'octobre 31 à avril 34 ; B. K. : 0.

En 1940, pendant la 2e gestation : B. K. + pendant 3 mois.

1943 : Voile au sommet D., B. K. 0.

Pendant la 4e grossesse : fatigue, amaigrissement, B. K. 0.

Le 9 mars 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.170, B. C. G. ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : au 4e mois, apparition d'hémoptysies répétées ; lésions bilatérales qui évoluent rapidement et la malade est décédée en novembre 44.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1338. — H... L., 28 ans, I-pare.

1935 : Caverne sous-claviculaire D., B. K. +; PNO D.

1937 : Lésion G.; B. K. +; PNO G.; B. K. : 0.

Janvier 43 : Arrêt des 2 PNO ; bon état général.

Fatigue dès le début de la grossesse ; B. K. + en janvier 44 (3e mois).

Scopie de mai 44 : infiltration diffuse des 2 sommets qui ne s'éclairent pas à la toux, surtout à D.; présence d'une caverne sous-claviculaire D. au sein d'une zone condensée de parenchyme ; grisaille et infiltration homogène de tout le champ pulmonaire G. ; culs-de-sac symphysés et comblés.

Le 25 juin 44 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.700, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : 3 mois après l'acc. : aggravation rapide des lésions pulmonaires et la malade est décédée le 8 décembre 44.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Année 1945

Obs. N° 49. — B... L., 27 ans, II-geste, I-pare.

1° 1937 : Avortement provoqué de 2 mois, suivi de curettage.

1933 : Hémoptysie, lésion G., B. K. +; PNO G. sans bon résultat, abandonné au bout de quelques mois.

1934 : Thoracotomie G.

1936 : Lésion au sommet D., B. K. +; PNO D. entretenu depuis.

Avortement de 1937 sans influence sur l'état pulmonaire ; B. K. 0 à partir de 1942.

Pendant la grossesse : 3 hémoptysies, dont une plus importante le 26 décembre 44.

Le 6 janvier 45 : Acc. N. près T. : fille, 2.650, B. C. G.; R. U. pour hémorragie ; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : volumineuse caverne sous le PNO D.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 339. — C... A., 28 ans, I-pare.

1940 : Caverne G., B. K. +; PNO G. suivi d'une section de brides en 1941.

1942 : Epanchement G. qui se résorbe ; B. K. 0 depuis début 43.

Juillet 44, au 2e mois de la grossesse : nouvel épanchement qui amène l'interruption du PNO.

Le 12 février 45 : Acc. N. à T. : fille (bec-de-lièvre), 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 536. — R... P., 23 ans, I-pare.

1941 : Tuberculose bilatérale, excavée à G., infiltrée à D., B. K. +.

1942 : PNO G.; B. K. : 0.

Au début de la grossesse : fléchissement marqué de l'état général avec toux et expectoration.

Le 9 mars 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.060, B. C. G.; D. N.; S. de C. N. jusqu'au 10e jour où apparaissent des hémorragies utérines répétées, et malgré toute la thérapeutique mise en œuvre, la malade est décédée le 14e jour.

Obs. N° 634. — D... S., 35 ans, I-pare.

1935 : Lésions diffuses d'aspect fibreux avec caverne juxta-hilaire G.; B. K. +.

Séjour en sana de 1935 à 1938 ; B. K. : 0.

De 1939 à 1942 : B. K. + par intermittence.

Septembre 44, au 2e mois de la grossesse : PNO D. sur scissurite excavée.

Le 21 mars 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.000 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : stationnaire.

Enfant décédé au 4e mois après opération de mastoïdite.

Obs. N° 834. — B... S., 22 ans, I-pare.

1941 : Lésion du sommet D., B. K. + ; PNO D.; B. K. : 0.

Octobre 44 : au 3e mois de la grossesse : lésion sous-claviculaire G.; B. K. +; PNO G. qui sera interrompu en janvier 45 pour réaction liquidienne importante.

Le 18 avril 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : évolution et aggravation côté G.

Etat pulmonaire actuel : stationnaire.

Etat actuel de l'enfant : très satisfaisant.

Obs. N° 1679. — Q... S., 25 ans, I-pare.

Janvier 39 : petite caverne du sommet G.

Juillet 39 : 2 cavernes au niveau du lobe moyen du poumon D.

Septembre 39 : PNO D., entretenu depuis ; tentatives infructueuses de PNO G.

Novembre 40 : Thoracoplastie G. sans aucun résultat.

Evolution G. arrêtée après drainage en septembre 41.

Pendant la grossesse : mauvais état général ; scopie de février 45 : à G. : grosse caverne sous-claviculaire avec niveau liquide ; à D. : PNO ; base recollée, sommet adhérent.

Le 6 août 45 : Forceps à 8 mois pour non progression et fatigue maternelle : fille, 2.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant ; traitement par spléotomie.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1593. — B... E., 29 ans, II-pare.

1° 1941 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

1942 : Caverne G., B. K. + ; PNO G. suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Mars 45 : Au 6e mois de la grossesse : caverne D., B. K. : 0 ; PNO D.

Le 26 juillet 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.790, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant ; PNO G. arrêté en mai 46.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1795. — R... H., 30 ans, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 1934, 35 et 37 ; D. N.; S. de C. N.

Mars 44 : Lésion G., B. K. + ; PNO G. abandonné en mai 45 pour symphyse.

Juillet 45 : Au 7e mois de la grossesse : B. K. + ; à la scopie : à G. : PNO partiel ; collection de liquide se prolongeant très nettement en arrière, peu abondante ; à D. : hilè très volumineux ; taches dans le lobe supérieur.

Le 20 août 45 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.800, décédée le 20e jour ; D. N.; S. de C. N.

Après sa sortie de l'hôpital : amaigrissement important ; en octobre 45: condensation de la moitié supérieure du poumon D. et infiltration avec ramollissement du 1/3 supérieur G. ; l'évolution se fait rapidement et la malade est décédée en janvier 46.

Obs. N° 1893. — M... Y., 27 ans, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 1938, 39 et 40 ; D. N.; S. de C. N.

Août 44 : Pneumonie D.

Septembre 44 : Cavité du sommet D.

Tentatives infructueuses de PNO D.; repos ; calcium I. V.

B. K. + depuis juillet 45, au 7e mois de la grossesse.

Le 1er septembre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.100, décédé le 11e jour ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2801. — C... G., 37 ans, V-pare.

4 acc. N. à T. en 1933, 34, 35 et 42 ; D. N.; S. de C. N.

1938 : Pleurésie D., B. K. : 0 ; repos ; calcium.

Grossesse de 1942 sans influence sur l'état pulmonaire.

Le 5 novembre 45 : B. K. + pour la première fois ; lésions bilatérales.

Le 18 décembre 45 : Acc. par le siège à 8 mois : fille, 2.450, décédée le 14e jour de broncho-pneumonie ; D. N.; S. de C. fébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état de faiblesse très prononcé.

Etat pulmonaire actuel : stationnaire.

Obs. N° 2859. — R... M., 20 ans, I-pare.

Mars 45 : 3 hémoptysies ; lésion G., B. K.+ ; séjour en sana.

D. R. : 18-22 avril.

Octobre 45 : Au 6e mois de la grossesse : lésion D., B. K. +.

Scopie du 20 décembre 45 : Infiltration à type granulique presque totale des 2 hémithorax avec signes de spélonques volumineuses sous la clavicule G.

Le 25 décembre 45 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.550, décédée le 12e jour d'une otite ; D. N.; S. de C. fébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : fatigue et gros amaigrissement.

Etat pulmonaire actuel : en amélioration.

Obs. N° 2898. — C... G., 28 ans, V-pare.

4 acc. N. à T. en 1936, 39, 40 et 42 ; D. N.; S. de C. N.

Juin 44 : Pleurésie G.

Août 44 : Hémoptysie, lésion au poumon D.; repos ; l'état général s'améliore.

Dès le début de la grossesse : reprise de l'évolution ; B. K. + en août 45, au 4e mois de la grossesse ; PNO D. en septembre 45.

Le 29 décembre 45 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.600, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles.

Evolution bilatérale rapide et la malade est décédée en sana le 18 janvier 46.

Etat actuel de l'enfant : bon.

FEMMES NON RETROUVÉES

Année 1944

Obs. N° 318. — D... R., 28 ans, I-pare.

Février 43 : Hémoptysie importante, spélonque du sommet G., B. K. +. Tentatives infructueuses de PNO G.

B. K. 0 à partir d'avril 43.

Bronchite en septembre 43 : B. K. + au 5e mois de la grossesse.

B. K. 0 depuis octobre 43.

Scopie de décembre 43 : infiltrat sous-claviculaire G. sans caverne visible ; trame hilaire accentuée des 2 côtés ; culs-de-sac libres.

Le 11 février 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : garçon, 2.700, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 732. — L... C., 22 ans, I-pare.

Janvier 42 : Pleurésie séro-fibrineuse D. vérifiée par ponction.

Février 44, au 7e mois de la grossesse : hémoptysie, tuberculose pulmonaire en évolution, B. K. 0.

Le 3 avril 44 : Acc. N. à T. : garçon, 2.900, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 754. — Le J... S., 31 ans, I-pare.

1939 : Bronchite ; congestion pulmonaire.

1940 : Rechute ; B. K. +; traitement par calcium I. V. et Panxinon.

Au 5e mois de la grossesse, en décembre 43 : laryngite avec B. K. +.

Le 5 avril 44 : Forceps à dilatation complète : fille, 2.000 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1021. — D... B., 20 ans, I-pare.

A l'âge de 9 ans : adénopathie trachéo-bronchique.

Séjour en préventorium pendant 1 an, puis suivie régulièrement.

Perdue de vue de 1939 à 1942 ; vue alors à Cochin avec tuberculose évolutive bilatérale des 2 sommets à prédominance D., avec B. K. +. Institution d'un PNO D. qui se décolle bien ; B. K. : 0 ; bon état général. Malade indisciplinée, refuse le séjour en sana, n'entretient plus son PNO. Revue en 1943 : mauvais état général, amaigrissement, asthénie ; difficulté de reprise du PNO qui peut néanmoins être insufflé. Repart avec un état général satisfaisant. Dès sa sortie, la malade devient enceinte. Retourne à Cochin au 8e mois de la grossesse avec un état général déplorable, B. K. +, reprise évolutive des 2 lésions apicales, à tendance ulcéro-caséeuse.

Le 11 mai 44 : Acc. par le siège à 8 mois : garçon, 2.000, B. C. G. ; D. N.; S. de C. fébriles (oscillations entre 38° et 40°).

Obs. N° 1636. — D... J., 31 ans, VI-geste, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 1933, 39 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

2 avortements provoqués en 1942, suivis de curettage.

Juillet 43 : Lésion au poumon D.; repos.
Novembre 43 : Tuberculose bilatérale, à forme fibro-caséeuse à D., à topographie nodulaire assez étendue avec excavation extra-hilaire juxta-corticale ; dissémination nodulaire plus récente intercléido-hilaire ; B. K. +.
Séjour en sana.
Mars 44 : PNO D.
Réaction liquidienne. Etat général médiocre.
Le 6 août 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.400, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles.

Obs. N° 2555. — C.-R... R., 34 ans, III-pare.
2 acc. N. à T. en 1933 et 34 ; D. N.; S. de C. N.
Décembre 35 : Hémoptysie, infiltration sous-claviculaire G. non excavée, B. K. 0.
Séjour en sana ; cicatrisation.
En juin 44, au 3e mois de la grossesse : réveil des lésions G., B. K. +.
Octobre 44 : PNO G.
3 jours avant l'acc. : montée thermique à 38°5 avec baisse de l'état général et malaise.
Le 17 décembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.500, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles avec très mauvais état général.
Graphie du 21 décembre 44 : présence de liquide dans la poche pleurale G. et présence d'images anormales diffuses dans la moitié inférieure du poumon D.

Année 1945

Obs. N° 383. — M... M., 27 ans, III-pare.
2 acc. N. (le 2e gémellaire) en 1940 et 42 ; D. N.; S. de C. N.
Février 39 : Pleurésie séro-fibrineuse ; séjour en sana pendant 8 mois.
2 premières grossesses normales.
Au 8e mois de la 3e grossesse : infiltration du sommet D., B. K. 0.
Le 17 février 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.620 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 732. — M... R., 26 ans, II-pare.
1° 1943 : Acc. N. à 8 mois ; D. N.; S. de C. N.
Juillet 44 : Hémoptysie, caverne G.; PNO G. suivi d'une section de brides.
Pendant la grossesse : laryngite tuberculeuse avec B. K. +.
Le 6 avril 45 : Acc. N. à 7 mois 1/2 : fille, 1.650, décédée quelques heures après la naissance ; D. N.; S. de C. fébriles avec persistance de la laryngite.

Obs. N° 1012. — S... G., 31 ans, III-geste, I-pare.
1° 1934 : Avortement provoqué de 2 mois, suivi de curettage.
2° 1943 : Grossesse extra-utérine rompue, opérée à 3 semaines.
Mars 44 : Pleurésie D .
Novembre 44, au 3e mois de la grossesse : hémoptysie, B. K. +, radio négative.

Décembre 44 : B. K. 0.
Le 9 mai 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.500 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1532. — N... M., 28 ans, IV-pare.

3 acc. N. (le 3e gémellaire) en 1937, 38 et 40 ; D. N.; S. de C. N.
1934 : Lésion du sommet G., B. K. + ; PNO G. entretenu pendant 2 ans 1/2 ; B. K. : 0.
3 premières grossesses normales.
En mars 45, au 5e mois de la IVe gestation : pleurésie G., B. K. +.
Le 17 juillet 45 : Acc. N. à T. : garçon, 4.360, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 2340. — P... S., 36 ans, II-pare.

1° 1938 : Acc. N. à 8 mois ; D. N.; S. de C. N.
1936 : Pleurésie G.
1re grossesse sans influence sur l'état pulmonaire.
Au début de la 2e grossesse : voile du sommet D.; repos ; au 6e mois : radio négative.
Le 24 octobre 45 : Acc. à T. par le siège : garçon, 3.590 ; D. N.; S. de C. N.

TUBERCULOSES COMPLIQUÉES UNIQUEMENT PENDANT LES SUITES DE COUCHES

Nombre d'observations : 19.
Parité par rapport à l'apparition de la tuberculose :

Primipares : 15
Multipares : 4

Ancienneté de la tuberculose par rapport à la grossesse compliquée pendant les S. de C. :

Moins d'un an : 3
Entre 1 et 2 ans : 3
Entre 2 et 3 ans : 4
Entre 3 et 4 ans : 2
Entre 4 et 5 ans : 4
Plus de 5 ans : 3.

Forme de la tuberculose :

Tuberculose fibro-caséeuse : 13
Tuberculose fibreuse : 6.

Avortements : 2
Accouchements : 17.

Accouchement N. : 12
Forceps : 4 pour fatigue maternelle
Version par manœuvres internes : 1.

Délivrance :

D. N. : 15
D. N. hémorragique : 2.

S. de C. immédiates :

S. de C. N. : 9
S. de C. subfébriles : 8
S. de C. fébriles : 2.

Pendant les six mois qui ont suivi l'accouchement :

Etat général touché : 3
B. K. + : 1

Hémoptysie : 1
Aggravation des lésions : 2
Bilatéralisation des lésions : 3
Réaction liquidienne : 4
Réaction pleurale : 1
Pleurésie : 1
Congestion pulmonaire : 1
Symphyse du PNO : 1
Adénite cervicale : 1.

Etat pulmonaire actuel : 17 femmes sur 19 ont pu être retrouvées :
Etat satisfaisant : 15
Etat stationnaire : 2.

Grossesses ultérieures :

5 femmes ont eu une grossesse ultérieure sans complications.
1 femme a eu 1 grossesse également compliquée pendant les S. de C., puis 4 grossesses sans complication.

En conclusion, les complications pendant les suites de couches surviennent plus souvent chez les primipares que chez les multipares ; l'ancienneté de la tuberculose par rapport à la grossesse ne semble jouer aucun rôle ; ces complications apparaissent principalement dans les formes fibro-caséeuses et se manifestent surtout soit par une aggravation ou une bilatéralisation des lésions, soit par une réaction liquidienne.

Les 19 cas cités comprennent 13 complications légères et 6 complications graves.

TUBERCULOSES COMPLIQUÉES PENDANT LES SUITES DE COUCHES

Année 1944

Obs. N° 186 bis. — B... L., 30 ans, III-pare.
2 acc. N. en 1932 et 33 ; D. N.; S. de C. N.
Janvier 41 : Episode fébrile avec mauvais état général et toux.
Malgré B. K. 0, création d'un PNO D. en avril 41.
Avril 42 : infiltration apicale G. avec B. K. +; PNO G.
Sections de brides à D. et à G.
Depuis janvier 43 : B. K. 0.
Crise liquidienne à D. en février 43.
Grossesse normale.
Le 26 janvier 44 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.850, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : le 2e mois, légère réaction pleurale sans suite, mais avec température jusqu'à 39°6.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant ; PNO G. toujours insufflé, PNO D. arrêté depuis avril 45.

Etat actuel de l'enfant : bon état général, urticaire.

Obs. N° 430. — P... G., 38 ans, V-geste, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 1935, 37 et 40 ; D. N.; S. de C. N.

1 avortement de 4 mois suivi de curettage en 1939.

1942 : B. K. +; à D. : plage d'ombre non homogène occupant les 2/3 du champ pulmonaire avec rétraction thoracique ; à G. : épais tractus entre hile et clavicule ; diminution de transparence de l'angle intercléido-hilaire.

Séjour en sana.

Août 43 : Fines condensations des 2 sommets avec petite image claire suspecte derrière la clavicule D.

Grossesse normale.

Le 25 février 44 : Version par manœuvres internes après dilatation aux ballons pour présentation de l'épaule.

Fille, 2.780, morte avant tout début de travail ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : 1 mois après, adénite cervicale G. suppurée d'origine bacillaire.

Etat pulmonaire actuel : nettoyage relatif des lésions, surtout à G.; bon état général.

Obs. N° 723. — Van C... S., 28 ans, I-pare.

1939 : Hémoptysie importante, B. K. +, infiltration à D., caverne à G.

1940 : PNO G. abandonné en 1942 pour grosse réaction liquidienne ; B. K. : 0 3 mois après la création du PNO.

Grossesse normale ; scopie de février 44 : à G. : cul-de-sac costo-diaphragmatique en partie comblé ; pas d'image de PNO visible ; grisaille de tout le champ pulmonaire avec sommet s'éclairant mal à la toux ; à D. : accentuation marquée des arborisations hilaires sans image pathologique visible.

Le 2 avril 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.590 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : amaigrissement de 15 kgr.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1370. — M... M.-L., 41 ans, VI-geste, V-pare.

4 acc. N. à T. en 1931, 32, 33 et 35 ; D. N.; S. de C. N.

1 avortement de 3 mois suivi de curettage en 1937.

1941 : Lésion au poumon G., B. K. +.

Séjour en sana ; traitement par les sels d'or.

1942 : PNO G. se décollant mal ; section de brides ; grosse réaction liquidienne ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 29 juin 44 : Acc. N. à T. : garçon, 2.820, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : 5 mois après, petite lésion au poumon D., B. K. + pendant 6 mois ; tentatives infructueuses de PNO D.
Etat pulmonaire actuel : bon état, surtout le poumon G. où le PNO est toujours insufflé ; le poumon D., toujours taché, est surveillé.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1906. — D... A., 23 ans, II-pare.
1° 1943 : Forceps à T.; D. N.; S. de C. N.
1939 : Primo-infection : cuti + +, infiltration sous-claviculaire D.
1940 : Lésion G.; PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides.
Après le 1er acc. : légère réaction liquidienne.
2e grossesse normale.
Le 15 septembre 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.700 ; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2071. — L... M., 30 ans, III-geste, II-pare.
1° 1936 : Acc. N. à T. : 3.060, bpt ; D. N.; S. le C. N.
2° 1937 : Avortement de 2 mois 1/2 ; suites normales.
1941 : Adénite cervicale suppurée ; I. T. N.; B. K. 0.
1942 : Episode fébrile, fatigue, amaigrissement ; tache au sommet D.
Repos 2 ans à la campagne.
Grossesse normale.
Le 11 octobre 44 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.100, B. C. G. ; D. N. ; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : congestion pulmonaire le 2e mois.
Etat pulmonaire actuel : bon.
Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 2233. — F... J., 21 ans, I-pare.
Décembre 39 : Tache à G., grisaille à D., B. K. 0.
Août 40 : Lésion D., B. K. + ; PNO D. entretenu depuis, suivi de 2 sections de brides.
Novembre 42 : Lésion G.; PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.
Le 2 novembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.700, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : très grande fatigue, anorexie, amaigrissement.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2426. — P... H., 24 ans, II-pare.
1° 1942 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
Octobre 41 : Cavité dans le lobe inférieur D., B. K. +.

Décembre 41 : PNO D. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 30 novembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.140 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : aggravation des signes fonctionnels et réapparition des B. K. dans l'expectoration.

Décembre 45 : Lésion G.; tentatives infructueuses de PNO G.

Le 25 août 46 : Après une grossesse normale, forceps après 42 heures de travail : garçon, 4.830 ; D. N. hémorragique ; S. de C. subfébriles les premiers jours.

Etat pulmonaire actuel : stationnaire.

Etat actuel des enfants : bon.

Obs. N° 2607. — M... M., 36 ans, II-pare.

1° 1943 : Acc. N. à T. : 3.700, bpt ; D. N.; S. de C. N.

1936 : Infiltrat sous-claviculaire G., B. K. + ; PNO G. entretenu jusqu'en 1943 ; B. K. : 0.

Grossesse normale ainsi que la précédente.

Le 24 décembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.750, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : très grande fatigue, améliorée par calcium I. V. et Stérogyl.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Année 1945

Obs. N° 404. — B... M., 32 ans, I-pare.

1933 : Lésion D., B. K. + ; PNO D., entretenu jusqu'en 1940 ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 20 février 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.060, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

1 mois 1/2 après l'acc. : pleurésie D.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 758. — M... M., 21 ans, I-pare.

Avril 43 : Hémoptysie, B. K. + ; lésion G., poumon D. suspect.

Mai 43 : PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 9 avril 45 : A mois 1/2, forceps pour fatigue maternelle : garçon, 2.800, B. C. G.; D. N. hémorragique ; S. de C. fébriles les premiers jours.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : très grande fatigue ; aggravation des lésions D. dans une zone déjà suspecte auparavant ; création en novembre d'un PNO D. suivi de 2 sections de brides.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Enfant décédé à 4 mois du choléra infantile.

Obs. N° 838. — P... L., 35 ans, I-pare.

Avril 42 : Grosse cavité centrale D., laryngite tuberculeuse, B. K. + ; PNO D.; B. K. 0 depuis début 43.

Grossesse normale.

Le 19 avril 45 : Forceps pour fatigue maternelle : fille, 2.800, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : le PNO D. s'est symphysé et a dû être abandonné ; arthrite de la hanche G. par forte décalcification.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon ; retard de la marche.

Obs. N° 852. — M... J., 41 ans, VI-pare.

5 acc. N. à T. en 1926, 29, 30, 31 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

1924 : Hémoptysie, caverne G., B. K. + ; PNO G.; B. K. : 0.

2 mois après le 1er acc. : hémoptysie, B. K. + ; extension des lésions ; réaction liquidienne importante amenant l'arrêt du PNO.

Après le 2e acc. : B. K. + pendant plusieurs mois.

3e, 4e, 5e et 6e grossesses normales.

Le 21 avril 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.850, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1015. — L... Y., 37 ans, II-pare.

1° 1934 : Acc. N. à T. ; D. N.; S. de C. N.

Novembre 29 : Hémoptysie, caverne G., B. K. + ; PNO G.

Juillet 30 : Réaction liquidienne purulente ; PNO abandonné.

Séjour en sana ; B. K. : 0 ; le liquide se résorbe.

1931 : Rechute avec B. K. + pendant 6 mois.

Après le 1er acc. : rechute, B. K. + pendant 8 mois, lésion D.; PNO D., entretenu jusqu'en 1940, après guérison clinique.

2e grossesse normale.

Le 10 mai 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.700, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 1159. — B... M., 23 ans, I-pare.

Fin 42 : Adénite cervicale et axillaire D.

Janvier 44 : Caverne du sommet D., B. K. + ; PNO D. ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 30 mai 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.150, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles avec réaction liquidienne.

Obs. N° 1385. — L... G., 25 ans, I-pare.

Septembre 40 : Lésions bilatérales à prédominance D., B. K. + ; PNO G. abandonné en novembre 41 pour symphyse progressive ; PNO D. abandonné en février 43 pour symphyse progressive ; B. K. 0 depuis la création des PNO.

Grossesse normale ; scopie d'avril 45 : images de condensation dans la région sous-claviculaire G. et dans le lobe moyen du poumon D. qui est revenu complètement à la paroi.

Le 28 juin 45 : Forceps pour fatigue maternelle : fille, 3.810, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : très grande fatigue avec légère aggravation des lésions ; cystite (tuberculose rénale ?).

Etat pulmonaire actuel : stationnaire.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1389. — F... E., 24 ans, I-pare.

1942 : Caverne G., B. K. + ; PNO G.; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 28 juin 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.650, B. C. G.; D. N. hémorragique avec léger shock ; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : amaigrissement de 10 kgr. ; 5 mois après l'acc. : PNO D. pour infiltration D.

Etat pulmonaire actuel : PNO G. arrêté en août 46 ; PNO D. toujours insufflé.

Etat actuel de l'enfant : bon.

TUBERCULOSES COMPLIQUÉES APRÈS UN AVORTEMENT

Obs. N° 1991, année 1944. — H... M., 38 ans, III-geste, I-pare.

2 avortements de 2 mois en mars 34 et en mai 35.

Janvier 35 : Hémoptysie, spélonque du sommet G., B. K. +; PNO G. suivi de 2 sections de brides.

Juillet 35, 2 mois après le second avortement : forte crise liquidienne entraînant l'arrêt du PNO.

B. K. 0 en décembre 35.

1939 : Infiltrations à D., B. K. +; PNO D. entretenu depuis, suivi d'une section de brides.

B. K. 0 depuis 1940.

Grossesse normale.

Le 28 septembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.000, B. C. G. ; D. N. ; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1847, année 1945. — M... P., 30 ans, III-geste, I-pare.

1932 : Hémoptysie, lésion G., B. K. 0.

Traitement par les sels d'or.

1936 : Avortement de 3 mois suivi de curettage ; suites fébriles.

1938 : Hémoptysie, caverne du sommet G., B. K. +.

Thoracoplastie G. proposée puis rejetée vu l'état général mauvais de la malade. Traitement par les sels d'or.

Hémoptysies fréquentes au moment des règles avec alternance de crachats bacillifères et non bacillifères.

Mai 39 : Avortement d'un mois ; suites normales.

Août 39 (3 mois après l'avortement) : hémoptysie sans signes évolutifs.

A partir de 1940 : B. K. 0.

Grossesse normale.

Le 25 août 45 : Forceps à dilatation complète : garçon, 3.150, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : pachypleurite G. ; accentuation de la trame à D.

Etat actuel de l'enfant : bon.

TUBERCULOSES DÉBUTANT CLINIQUEMENT PENDANT LA GROSSESSE

Nombre d'observations : 50.

Parité au moment où est apparue la tuberculose ;

- Primipares : 23
- Multipares : 27.

Moment de l'apparition de la tuberculose :

- 1er mois : 2
- 2e mois : 9
- 3e mois : 8
- 4e mois : 9
- 5e mois : 7
- 6e mois : 4
- 7e mois : 7
- 8e mois : 0
- 9e mois : 1.
- Non précisé : 3.

Forme de la tuberculose :

- Tuberculose fibro-caséeuse : 16
- Tuberculose fibreuse : 32
- Tuberculose pleurale : 2.

Accouchement :

- Acc. N. : 43
- Forceps : 7.
  - Application systématique : 3
  - Pour non progression : 2
  - Pour fatigue maternelle : 1
  - Pour souffrance fœtale : 1.

Délivrance :

- D. N. : 46
- D. N. hémorragique : 2
- D. A. pour hémorragie : 1
- R. U. : 1.

S. de C. immédiates :

S. de C. N. : 28
S. de C. subfébriles : 15
S. de C. fébriles : 7 (1 réaction liquidienne ++).

28 femmes sur 50 ont pu être retrouvées.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'accouchement :

Etat satisfaisant : 16
Etat général touché : 4
Aggravation des lésions : 6
Bilatéralisation des lésions : 2.

Etat pulmonaire actuel :

Etat satisfaisant : 14
Etat stationnaire : 3
Etat aggravé : 6
Décès : 5.

Grossesses ultérieures :

1 femme a eu 1 grossesse normale.
1 femme a eu 3 grossesses normales.
1 femme a eu 1 avortement et 3 grossesses normaux.
1 femme a eu 1 grossesse compliquée (état général touché) et une autre normale.
1 femme a eu 1 avortement normal et 1 grossesse compliquée (état général touché).
2 femmes ont eu 1 grossesse compliquée après l'acc. (aggravation des lésions).
1 femme a eu 2 avortements normaux et 1 grossesse compliquée après l'acc. (réaction liquidienne).
1 femme a eu 1 grossesse compliquée (B. K. +), 1 grossesse normale, et une grossesse compliquée (B. K. +).
1 femme a eu une grossesse compliquée (B. K. +).
1 femme a eu 1 grossesse normale et 1 grossesse compliquée après acc. (adénite cervicale et légère péritonite tuberculeuse).

En conclusion, la parité ne joue aucun rôle dans l'apparition de la tuberculose qui survient surtout du 2e au 7e mois de la grossesse.

Le nombre relativement important de complications survenues pendant les suites de couches et de décès ultérieurs prouve que ce sont les formes les plus graves et donc les plus à surveiller.

FEMMES RETROUVÉES

Année 1944

Obs. N° 328. — F... M., 30 ans, I-pare.

Au début de la grossesse : grande fatigue.

Octobre 43 : Lésion du sommet D. Traitement par calcium I. V.; B. K. toujours 0.

Le 12 février 44 : Forceps pour lenteur de l'expulsion : fille, 2.800 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état de santé relativement bon pendant 4 mois, puis grande fatigue et congestion pulmonaire en août 44.

Etat pulmonaire actuel : aggravé.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 513. — B... L., 37 ans, XII-geste, VII-pare.

1926 : B. W. ++.

6 acc. en 1925, 26, 28, 37, 41 et 42.

5 avortements en 1927, 30, 32, 39 et 40.

1942 : Au 6e mois de la XIe gestation : lésion ulcéro-nodulaire D., B. K. +.

XIIe grossesse normale.

Le 7 mars 44 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.250, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : excavation de la lésion D. et apparition de lésions à G.

Malade décédée le 4 mars 45.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 770. — P... H., 21 ans, I-pare.

Septembre 43, au 3e mois de la grossesse : lésions évolutives du sommet G. avec B. K. +.

Janvier 44 : PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.

Le 8 avril 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.450, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : grande fatigue au début.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant, B. K. 0.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 823. — N... F., 24 ans, II-pare.

1° 1941 : Acc. N. à T. : 3.500, bpt ; D. N.; S. de C. N.

Décembre 40, au 5e mois de la 1re grossesse : caverne du sommet D. avec B. K. +; PNO D. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Pendant la 2e grossesse : amaigrissement, asthénie, vertiges, céphalées.

Le 15 avril 44 : Forceps à dilatation complète : garçon, 3.400, B. C. G.;

D. N. hémorragique ; léger shock ; R. U. pour placenta douteux ; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : fatigue générale sans rechute pulmonaire.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Enfant décédé à 26 jours d'hémorragie méningée.

A accouché de nouveau en 1945 (voir obs. n° 2540, année 1945).

Obs. N° 1069. — B... J., 23 ans, I-pare.

Décembre 43, au 4e mois de la grossesse : infiltration diffuse sous-claviculaire, plus marquée à G. qu'à D., B. K. 0.

Le 19 mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.280, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : 2 mois 1/2 après, cavité du sommet G., B. K. +; PNO G. créé le 8 août 44 et suivi d'une section de brides.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant, B. K. 0.

Etat actuel de l'enfant : satisfaisant.

Obs. N° 1088 bis. — K... Z., 28 ans, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 1934, 37 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

Novembre 43, au 2e mois de la grossesse : lésion D., B. K. +.

Décembre 43 : PNO D. impossible à continuer, B. K. +.

Le 21 mai 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : aggravation des lésions D. et apparition de lésions à G., B. K. +.

Malade décédée le 5 mai 45.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1109. — F... Y., 23 ans, III-geste, I-pare.

2 avortements de 3 mois en 1941 et 42 ; suites normales.

Octobre 43, au 2e mois de la grossesse : cavité para-hilaire G., B. K. +.

Décembre 43 : PNO G.

Février 44 : Infiltration D. ; la malade refuse un PNO D.

Le 23 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.600, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : fatigue, amaigrissement ; en juillet 44 : à G., la cavité a beaucoup diminué ; à D., lésions étendues et excavées ; PNO D.

Malgré le PNO D., il persiste des images résiduelles sous le PNO ; B. K. +.

Le processus continue à évoluer et la malade est décédée le 8 avril 45.

Enfant décédé à 4 mois des suites d'une opération pour mastoïdite.

Obs. N° 1122. — C... B., 23 ans, I-pare.

Janvier 44, au 5e mois de la grossesse : hémoptysie, B. K. +, nodules disséminés dans le champ pulmonaire G.; PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides.

Le 26 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 2.450, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : très grande fatigue.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1310. — S... A., 23 ans, I-pare.

Décembre 43, au 3e mois de la grossesse : toux et point de côté G.

Janvier 44 : Début de laryngite par dysphonie.

Février 44 : B. K. +, infiltrat du lobe moyen G. qui s'excave rapidement ; PNO G. suivi d'une section de brides.

Scopie de juin 44 : à G., image de PNO bien décollé ; présence dans la partie inférieure du moignon pulmonaire collabé d'une image spéloncaire de la grosseur d'une grosse noix, dont la paroi affleure la corticalité du parenchyme pulmonaire, rigide et qui n'a aucunement été affaissée par la collapsothérapie ; légère réaction liquidienne ; à D., aucune image de lésion évolutive ; la trame est cependant nettement accentuée dans la partie inférieure du champ pulmonaire D.

Le 20 juin 44 : Acc. N. à 8 mois ; fille, 2.450, décédée le 12e jour (présentait du pemphigus : mère B. W. —, père B. W. +) ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant ; B. K. 0 en novembre.

Ce n'est qu'à partir de février 45 (8 mois après l'acc.) que l'état général s'est aggravé ; des lésions évolutives sont apparues au poumon D., la laryngite a évolué et la malade est décédée le 26 août 45.

Obs. N° 1380. — D... L., 30 ans, II-pare.

1° 1941 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Février 44, au 5e mois de la grossesse : spélonque sous-claviculaire G. avec B. K. +; PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides.

Le 30 juin 45 : Acc. N. à T. : garçon, 4.050, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1696. — N... M., 25 ans, I-pare.

Décembre 43, au 1er mois de la grossesse : voile du poumon G.

Séjour à la campagne jusqu'en mars 44.

Mars 44 : Lésions du sommet G., B. K. + ; PNO G. entretenu depuis, suivi en avril d'une section de brides.

Le 15 août 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.350, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : stationnaire.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2088. — N... M., 28 ans, I-pare.

Février 44, au 2e mois de la grossesse : petits nodules sous-claviculaires G., B. K. +.

Avril 44 : PNO G.

Le 14 octobre 44 : Acc. N. à T. : fille, 4.000, B. C. G.; D. N. hémorragique ; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

En 1945 : 2 avortements de 2 mois ; suites normales.
Le 4 juin 46 : Après une grossesse normale, acc. N. à T. : garçon, 4.830, B. C. G.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : réaction liquidienne assez importante.
Etat pulmonaire actuel : PNO G. arrêté en février 47.
Etat actuel des 2 enfants : bon.

Obs. N° 2308. — M... M., 29 ans, IV-geste, II-pare.
1940 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
2 avortements provoqués de 2 mois en 1941 et 42 ; suites normales.
Mars 44, au 2e mois de la grossesse : petite caverne du sommet G., B. K. +.
Avril 44 : PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.
Le 15 novembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.750, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : tuberculose bilatérale très grave, à pronostic grave à brève échéance.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2360. — B... E., 24 ans, I-pare.
Mai 44, au 4e mois de la grossesse : lésion ulcéreuse du sommet G. avec B. K. +; PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.
Le 20 novembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : nécessité de faire une thoracoplastie G.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2528. — G... S., 32 ans, V-geste, IV-pare.
3 acc. en 1937, 39 et 42 ; D. N.; S. de C. N.
1 avortement de 3 mois en 1943, suivi de curettage.
En fin 41, pendant la 3e grossesse : caverne du sommet D., B. K. +.
Tentatives infructueuses de PNO D.
Amaigrissement et fatigue pendant la 5e grossesse.
Scopie de novembre 44 : Lésions ulcéro-nodulaires D. prédominant au lobe supérieur ; le sommet G. s'éclaire mal à la toux.
Le 15 décembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.280, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : stabilisé avec un beau résultat.
Etat actuel de l'enfant : bon.

Année 1945

Obs. N° 548. — C... M., 38 ans, VI-geste, V-pare.
1931 : Avortement de 5 mois ; suites normales.
4 acc. dont 2 forceps en 1937, 38, 39 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

1938 : Au cours de la 3e grossesse : caverne sous-claviculaire G., B. K. +. Traitement par repos et calcium ; B. K. : 0.

1939 : Pendant la 4e grossesse, B. K. + ; PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.

5e grossesse sans influence sur l'état pulmonaire.

Janvier 45, au 7e mois de la 6e grossesse : B. K. +.

Le 10 mars 45 : Forceps à dilatation complète : fille, 3.130, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 669. — C... M., 33 ans, II-pare.

1° 1942 : Acc. N. à T. : 3.000, bpt ; D. N.; S. de C. N.

Au 2e mois de la 2e grossesse : caverne du sommet D., B. K. + ; PNO D.; B. K. : 0.

Grossesse bien supportée.

Le 28 mars 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.500, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon ; PNO D. arrêté en septembre 46.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 818. — V... M., 28 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1939 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

A la fin du 1er mois de la 3e grossesse : tuberculose excavée du poumon G.; quelques nodules à D., B. K. +.

PNO G. interrompu 4 mois après pour réaction liquidienne importante.

Le 16 avril 45 : Acc. N. à T. : garçon, 2.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : aggravation en août 45 (4e mois), lésions évolutives bilatérales ; malade décédée le 1er octobre 46.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 854. — B... M.-T., 19 ans, I-pare.

Pendant les 5 premiers mois de la grossesse : grande fatigue, amaigrissement de 10 kgr.

Septembre 44, au 2e mois de la grossesse : caverne G., B. K. +.

Octobre 44 : PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Le 21 avril 45 : Forceps pour fatigue maternelle : garçon, 3.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles, mais pyélonéphrite et abcès de la marge de l'anus.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1053. — F... E., 37 ans, II-pare.

1° 1939 : Acc. à T. par le siège ; D. N.; S. de C. N.

Au 6e mois de cette 1re grossesse : tuberculose fibro-ulcéreuse bilatérale, B. K. +; séjour en sana.

Décembre 44 : Au 3e mois de la 2e grossesse : grande fatigue, B. K. +; tentatives infructueuses de PNO G.

Le 15 mai 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.850, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : stationnaire, après une légère aggravation fin 46.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1303. — V... M., 22 ans, II-pare.

1° 1943 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Janvier 45, au 3e mois de la 2e grossesse : 2 cavernes à G., B. K. +.

Mai 45 : PNO G. entretenu depuis.

Le 17 juin 44 : Acc. N. à 8 mois : fille, 2.550, B. C. G.; R. U. pour placenta incomplet ; S. de C. fébriles les premiers jours.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : extension des lésions ; section de brides en septembre 45.

Etat pulmonaire actuel : images macro-nodulaires disséminées dans le poumon D. avec cavernes multiples en nid d'abeille au sommet D.; à G., images floues pommelées du 1/3 moyen.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1373. — P... D., 23 ans, I-pare.

Au 4e mois de la grossesse : infiltration sous-claviculaire G., B. K. +.

Le 26 juin 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.700, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Radio du 18 juillet 45 : Nombreux nodules dans le champ pulmonaire G. avec lacune sous-claviculaire.

Le 22 juillet 45 : PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.

Juin 46 : Cavité para-hilaire D., B. K. +; PNO D. entretenu depuis.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1540. — B... M., 37 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1940 et janvier 42 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Au 7e mois de la 2e grossesse : voile du sommet G.

Février 42, 1 mois 1/2 après le 2e acc. : cavité juxta-hilaire G., B. K. +; PNO G. entretenu depuis ; B. K. : 0.

3e grossesse normale.

Le 19 juillet 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.450, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles avec clocher à 39° le 10e jour.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1793. — D... S., 26 ans, II-pare.

1° Juillet 43 : Acc. N. à T. : garçon, 3.470, bpt ; D. N.; S. de C. N.

Juillet 45, au 7e mois de la grossesse : infiltration nodulaire du sommet D., B. K. 0.

Le 20 août 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.650 ; D. N.; S. de C. fébriles les 4 premiers jours, puis normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon ; lésion cicatrisée.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1946. — M... A., 24 ans, II-pare.

1° 1944-: Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Octobre 43 : Au 4e mois de la 1re grossesse : amaigrissement important, toux, asthénie, anorexie ; radio négative.

Décembre 43 : 2 cavernes au sommet G., infiltration à D.

Janvier 44 : Hémoptysie, B. K. +.

Février 44 : PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

Suites du 1er acc.: état satisfaisant.

2e grossesse normale.

Le 8 septembre 45 : Acc. à T. par le siège : garçon, 3.070 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : évolution de la lésion D. qui s'excave.

Etat pulmonaire actuel : PNO G. toujours insufflé ; PNO D. extra-pleural.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2240. — B... E., 23 ans, I-pare.

Pleurésie G. à l'âge de 9 ans.

En avril 45, au 4e mois de la grossesse : hémoptysie de moyenne abondance, B. K. 0.

Scopie de mai 45 : Exagération des ombres bronchiques, surtout à G.

Le 13 octobre 45 : Forceps pour souffrance fœtale : garçon, 3.400 ; B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : grande fatigue.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2540. — N... F., 25 ans, III-pare.

Pour les antécédents, voir l'obs. n° 823, année 1944.

3e grossesse normale.

Le 17 novembre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 4.050, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Enfant décédé à 1 an de méningite.

Obs. N° 2575. — B... O., 26 ans. II-pare.

1° 1943 : Forceps à T.; D. A.; S. de C. N.

Mai 45 : Au 3e mois de la 2e grossesse : hémoptysie, lésion G., B. K. +.

Juillet 45 : PNO G., entretenu depuis ; B. K. : 0.

Scopie de novembre 45 : à G., PNO très poussé, moignon pulmonaire très collabé, légère réaction liquidienne ; à D., accentuation des ombres vasculaires ; présence de plusieurs petites taches peu denses dans la région sous-claviculaire.

Le 22 novembre 45 : Forceps à dilatation complète : garçon, 3.100, B. C. G.; D. A. pour hémorragie ; S. de C. fébriles avec poussée liquidienne obligeant à une ponction décompressive.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état relativement satisfaisant. Etat pulmonaire actuel : PNO G. toujours insufflé ; le côté D. n'a jamais évolué.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2776. — S... G., 19 ans, I-pare.

1942 : Primo-infection ; séjour de 8 mois en préventorium.

Novembre 45, au 7e mois de la grossesse : lésion G., B. K. +.

Décembre 45 : PNO G., entretenu depuis.

Le 16 décembre 45 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.300 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Enfant décédé à 4 mois des suites d'une hernie étranglée.

FEMMES NON RETROUVÉES

Année 1944

Obs. N° 177. — B... J., 35 ans, XII-geste, VIII-pare.

7 acc. N. en 1930, 31, 32, 34, 36, 37 et 39 ; D. N.; S. de C. N.

4 avortements en 1932, 35, 36 et 40, dont l'un suivi de curettage.

1936, au 7e mois de la 8e gestation : lésion au poumon D., B. K. + ; repos à l'hôpital avec reconstituants.

B. K. 0 depuis 1937 ; aucun incident pulmonaire depuis cette date.

Grossesse normale.

Le 24 janvier 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.410, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 370. — C... M., 30 ans, V-pare.

4 acc. N. en 1931, 33, 34 et 38 ; D. N.; S. de C. N.

1933 : Pendant la 2e grossesse : voile au poumon D.

3e grossesse sans influence sur l'état pulmonaire.

1935 : Episode pulmonaire aigu et laryngite ; caverne D., B. K. +.

1936 : PNO D. insufflé jusqu'en 1940, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0.

4e et 5e grossesses normales.

Le 18 février 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.490, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 644. — P... P., 24 ans, III-geste, II-pare.

1° 1941 : Acc. N. à T. : 3.950, bpt ; D. N.; S. de C. N.

2° 1942 : Avortement de 3 mois suivi de curettage.

Septembre 43, au 2e mois de la grossesse : forte asthénie, courbe thermique subfébrile ; lésion G., B. K. +.

PNO G. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0 ; réaction liquidienne importante.

Le 24 mars 44 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.000, décédé à 21 jours ; D. N.; S. de C. fébriles.

Obs. N° 762. — D... M., 21 ans, I-pare.

Décembre 43, au 5e mois de la grossesse : hymoptysie de moyenne abondance.

Janvier 44 : Nouvelle hémoptysie, amaigrissement important, B. K. 0. A la radio : légère grisaille de la base G.

Le 7 avril 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.700, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 850. — S... S., 24 ans, II-pare.

1° 1939 : Acc. N. à T. : 3.250, bpt ; D. N.; S. de C. N.

Janvier 44, au 6e mois de la grossesse : lésion G., B. K. + ; PNO G.

Le 19 avril 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.000 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1083. — C... F., 32 ans, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 1939, 41 et 43 ; D. N.; S. de C. N.

1939, au 7e mois de la 1re grossesse : hémoptysie, B. K. +, lésion G. 1940 (mars) : PNO G. entretenu jusqu'en novembre 41 ; B. K. : 0.

2e grossesse sans influence sur l'état pulmonaire.

Février 43 : 3e acc.; à la suite, apparition de ganglions cervicaux dont l'un coule toujours en 44 et d'une légère péritonite tuberculeuse à type ulcéro-caséeux avec ascite légère et discrets gâteaux péritonéaux : rien à signaler au point de vue pulmonaire.

4e grossesse normale ; scopie de mars 44 : hiles très chargés ; sommets s'éclairant à la toux ; à G., au-dessous de la pointe de l'omoplate, image cicatricielle ; PNO non visible ; aucune image évolutive.

Le 20 mai 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.000, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1376. — M... M., 24 ans, I-pare.

Avril 44, au 7e mois de la grossesse : lésion G. évolutive, B. K. + ; PNO G.

Le 30 juin 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.800 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 1569. — C... M.-Th., 23 ans, I-pare.

Au début de la grossesse : crachats hémoptoïques, lésion G. légère, B. K. 0.

Séjour en sana.

B. K. + le 10 juillet 44 ; PNO G. créé le 11 juillet 44.

Le 27 juillet 44 : Forceps à dilatation complète : garçon, 3.800, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1998 bis. — R... H., 26 ans, III-pare.

2 acc. en 1941 et 43 ; D. N.; S. de C. N.

Au 3e mois de la 3e grossesse : lésions discrètes et diffuses, B. K. +.

Traitement par repos et calcium I. V. ; l'état général s'améliore ; B. K. : 0.

Le 27 septembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.730, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2241. — B... A., 24 ans, III-geste, II-pare.

1° 1940 : Avortement provoqué de 2 mois 1/2, suivi de curettage.

2° 1942 : Acc. N. à T. : 2.750, bpt ; D. N.; S. de C. N.

Mai 44, au 4e mois de la grossesse : point de côté à la base D., B. K. 0 ; à la radio : scissurite.

Traitement par repos et calcium I. V.

Le 3 novembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.410, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2243. — B... L., 29 ans, I-pare.

Juillet 44, au 6e mois de la grossesse : lésions G., poumon D. normal ; la malade refuse la création d'un PNO G.

Scopie d'octobre 44 : à G., nombreuses opacités nodulaires de la région sous-claviculaire ; caverne avec niveau liquide située dans la région moyenne qui s'est nettement approfondie depuis juillet ; à D., nombreux nodules apparus depuis juillet.

Le 2 novembre 44 : Création d'un PNO G.

Le 4 novembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 2.500, B. C. G.; D. N.; S. de C subfébriles.

Obs. N° 2472. — G... A., 22 ans, I-pare.

Mai 44, au 4e mois de la grossesse : primo-infection tuberculeuse se traduisant par toux, amaigrissement, légère expectoration (B. K. 0) ; à la radio : léger voile et petite lésion à G.

Traitement par le repos.

En novembre 44 : disparition radiologique des images pathologiques.

Le 7 décembre 44 : Acc. N. à T. : fille, 3.080, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Année 1945

Obs. N° 28. — N... A., 21 ans, I-pare.

Juin 44, au 3e mois de la grossesse : voile de la base du poumon G.

Séjour en sana ; B. K. toujours 0.

Le 3 janvier 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles.

Obs. N° 601. — S... H., 29 ans, IV-pare.

3 acc. N. à T. en 1941, 42 et 43 ; D. N.; S. de C. N.

Novembre 44, au 5e mois de la 4e grossesse : voile du poumon G.

Pendant toute la grossesse : toux, dyspnée, B. K. 0.

Le 17 mars 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.350 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 889. — R... S., 37 ans, V-pare.

4 acc. N. à T. en 1928, 29, 30 et 33 ; D. N.; S. de C. N.

Avril 45, au dernier mois de la 5e grossesse : lésion sous-claviculaire G.

Le 25 avril 45 : Acc. N. à T. : fille, 2.800, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 1140. — M... L., 25 ans, I-pare.

A partir de décembre 44 (3e mois) : toux, expectoration, amaigrissement ++.

Le 27 mai 45 : Acc. N. à 8 mois : garçon, 2.450 ; D. N.; S. de C. fébriles.

Le 11 juin 45 : B. K.+; lésions diffuses dans les 2 champs pulmonaires ; 2 images cavitaires dans le champ pulmonaire D. à la partie supérieure ; 1 image cavitaire à la partie supérieure du poumon G.; série de nodules disséminés dans les 2 champs pulmonaires.

Obs. N° 1412. — R... M., 39 ans, XII-pare.

Syphilis depuis 1923.

11 grossesses antérieures ; seulement 2 enfants vivants.

Dès le début de la 12e grossesse : fatigue, asthénie, amaigrissement.

En avril 45 : A la base G., le long du bord cardiaque, assez gros nodules.

Le 1er août 45 : Acc. N. à T. : fille, 4.100, B. C. G.; D. N.; S. de C. fébriles les 2 premiers jours, puis normales.

Obs. N° 1724. — P... D., 21 ans, II-pare.

1° 1942 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Mai 45, au 7e mois de la 2e grossesse : tuberculose apicale D., B. K. +.

Tentatives infructueuses de PNO D.

Le 11 août 45 : Acc. N. à T. : anencéphale, 2.090, mort et macéré ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 1957. — L... P., 27 ans, II-pare.

1° 1943 : Acc. N. à 8 mois ; D. N.; S. de C. N.

Mai 45, au 5e mois de la 2e grossesse : caverne du sommet G., B. K. 0.

Août 45, au 8e mois : B. K. +.

Le 9 septembre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.750 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2231. — H... G., 22 ans, II-geste, I-pare.

1° 1942 : Avortement de 2 mois 1/2 ; suites normales.

A l'âge de 2 ans : grosse adénopathie trachéo-bronchique (graphie).

Mars 45, au 2e mois de la grossesse : pleurite D.; asthénie marquée ; amaigrissement important ; très mauvais état général ; à la scopie : sommet D. s'éclairant mal à la toux, accentuation des ombres hilaires.

Le 12 octobre 45 : Forceps pour non progression : fille, 3.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2713. — R... M.-T., 23 ans, II-pare.

1° Avril 44 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Avril 45, au 2e mois de la 2e grossesse : hémoptysies répétées, infiltrations sous-claviculaires D. avec cavernes, B. K. +.

Mai 45 : PNO D. suivi d'une section de brides ; petite réaction liquidienne se résorbant spontanément ; B. K. : 0.

Le 8 décembre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.600, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

TUBERCULOSES AYANT DÉBUTÉ CLINIQUEMENT APRÈS UN ACCOUCHEMENT OU UN AVORTEMENT

Il s'agit ici de femmes chez lesquelles la tuberculose est apparue après un accouchement ou un avortement antérieurs à la grossesse de 1944 ou 1945. Il est en effet évident que si une tuberculose est apparue pendant les suites de couches chez des femmes ayant accouché à Baudelocque pendant ces 2 années, ces femmes sont allées consulter dans des services spécialisés plutôt qu'à la maternité.

Nombre d'observations : 11.

Parité après laquelle est apparue la tuberculose :

Primipares : 3
Multipares : 8.

La tuberculose est apparue :

8 fois après un acc. N.
1 fois après un forceps
2 fois après un avortement suivi de curettage.

Forme de la tuberculose :

Tuberculose fibro-caséeuse : 6
Tuberculose fibreuse : 4
Tuberculose pleurale : 1.

Grossesses de 1944 ou 1945 :
10 grossesses normales ;
1 grossesse compliquée (état général touché).

Accouchement :

Acc. N. : 9
Forceps : 2

Application systématique : 1
Pour fatigue maternelle : 1

Délivrance :

10 D. N.
1 D. A. pour non décollement.

S. de C. immédiates :

S. de C. N. : 8

S. de C subfébriles : 3.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'accouchement :

Etat satisfaisant : 6

Complications : 3

Etat général touché : 1.

Hémoptysie : 1

Aggravation des lésions : 1

Etat pulmonaire actuel : 9 femmes sur 11 ont pu être retrouvées.

Etat satisfaisant : 8

Etat stationnaire : 1

DÉBUT APRÈS UN ACCOUCHEMENT

Année 1944

Obs. N° 1871. — G... M., 34 ans, III-geste, II-pare.

1° 1932 : Avortement de 2 mois ; suites normales.

2° 1942 : Forceps à T. : 3.200, bpt ; D. N.; S. de C. N.

5 mois après cet acc., en 1943 : lésion du sommet D., B. K. +; PNO D. suivi d'une section de brides ; réaction liquidienne : liquide ponctionné ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 12 septembre 44 : Forceps à dilatation complète : garçon, 3.600 ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : PNO D. abandonné par suite de réaction liquidienne importante ; état général satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2362. — H... R., 3 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1936 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

En juillet 42, à la fin de l'allaitement du 2e enfant : lésion D., B. K. +.

Août 42 : PNO D. entretenu depuis ; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 2 novembre 44 : Acc. à T. par le siège : garçon, 3.800, B. C. G.; D. A. pour non décollement ; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2424. — V... S., 31 ans, II-pare.

1° 1943 : Acc. N. à T. : 3.620, bpt ; D. N.; S. de C. N.

4 semaines après l'acc. : infiltrations du poumon D., B. K. +; PNO D. entretenu depuis, suivi d'une section de brides ; B. K. : 0 ; réaction liquidienne.

Grossesse normale.

Le 3 novembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.450 ; D. N.; S. de C. légèrement subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : petite hémoptysie le 5e mois.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Enfant décédé à 3 mois de gastro-entérite.

Obs. N° 2541. — L... M., 31 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1935 et 43 ; D. N.; S. de C. N.

Juin 43, 2 mois après le 2e acc. : pleurésie séro-fibrineuse D.

Novembre 43 : Infiltration légère du sommet D., B. K. 0.

Grossesse normale.

Le 16 décembre 44 : Acc. N. à 8 mois 1/2 : fille, 2.830, B. C. G; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant après une légère aggravation en janvier 46 par l'apparition de quelques nouvelles petites taches.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2660. — R... A., 27 ans, II-pare.

1° 1937 : Acc. N. à T. : 4.160, bpt ; D. N.; S. de C. N.

5 mois après l'acc. : nodules des 2 sommets, B. K. 0.

Séjour en sana.

Grossesse normale ; scopie de novembre 44 : fines taches au sommet G., exagération de l'image de la trame du sommet D.

Le 31 décembre 44 : Acc. N. à T. : garçon, 3.450, B. C. G.; D. N.; S. de C. subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : légère aggravation des lésions du sommet G.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Année 1945

Obs. N° 1328. — D... S., 27 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1937 et 42 ; D. N.; S. de C. N.

Octobre 42, 4 mois après le 2e acc. et pendant l'allaitement : 1 caverne sous-claviculaire D. et 1 caverne de la base D.; B. K. + ; PNO D.; B. K. : 0.

Grossesse normale.

Le 21 juin 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.200, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1350. — B... C., 30 ans, V-pare.

4 acc. N. à T. en 1936, 37, 39 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

En 1941, 2 mois après le 4e acc. et pendant l'allaitement : hémoptysie, petite tache au poumon D., B. K. 0.

Fin 43 : Hémoptysies, petite cavité au poumon D., B. K. 0.

Janvier 44 : PNO D.; épanchement léger qui se résorbe en mai 44.

Pendant la grossesse : amaigrissement, état général mauvais.

Le 24 juin 45 : Acc. N. à T. : fille, 3.400, B. C. G.; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : amaigrissement.

Etat pulmonaire actuel : le PNO D. se symphyse progressivement.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 1846. — M... O., 24 ans, III-pare.

2 acc. N. à T. en 1940 et 41 ; D. N.; S. de C. N.

2 mois après le 2e acc. : lésion du sommet G., B. K. 0 ; PNO G. entretenu depuis.

Grossesse normale.

Le 25 août 45 : Acc. N. à T. ; garçon, 3.560 ; D. N.; S. de C. N.

Obs. N° 2330. — P... F., 29 ans, II-pare.

1° 1942 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

3 mois après l'acc. : voile du poumon D.; repos ; calcium I. V.

Grossesse normale.

Le 23 octobre 45 : Acc. N. à T. : garçon, 3.390 ; D. N.; S. de C. N.

DÉBUT APRÈS UN AVORTEMENT

Obs. N° 388, année 1944. — L... J., 31 ans, V-geste, III-pare.

2 avortements suivis de curettage en mai et novembre 37.

2 acc. prématurés à 6 mois en 1938 et 39, le 1er suivi de curettage.

Aussitôt après le 2e avortement : lésion du sommet D.; PNO D.

Août 40 : Lésion G.; PNO G.

B. K. toujours 0.

Grossesse normale.

Le 21 fevrier 44, à 8 mois 1/2 : forceps pour lenteur de l'expulsion et fatigue maternelle : garçon, 2.900, B. C. G. ; D. N.; S. de C. N.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : PNO D. arrêté en avril 45 et PNO G. en juillet 46.

Etat actuel de l'enfant : bon.

Obs. N° 2143, année 1944. — L... L., 25 ans, V-geste, II-pare.

1938 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

3 avortements en 1941, 42 et 43, le dernier suivi de curettage.

Juillet 43, 2 mois après le 3e avortement : 3 hémoptysies ; B. K. 0 ; radio négative.

Novembre 43 : Infiltration du sommet D.; B. K. +.
Décembre 43 : PNO D. entretenu depuis ; B. K. : 0.
Grossesse normale.
Le 22 octobre 44 : Acc. à 8 mois : fille, 2.550 ; D. N.; S. de C. subfébriles.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'acc. : état satisfaisant.
Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.
Etat actuel de l'enfant : bon.

CONCLUSION ET ÉTIO-PATHOGÉNIE

Rist écrivait en 1921 : « En pratique, toute tuberculeuse qui devient gravide ou toute gestante chez laquelle se déclenche une tuberculose pulmonaire est menacée de mort à bref délai. »

De l'étude des statistiques que nous publions, il semble bien que cette opinion soit erronée. Il faut d'ailleurs noter que toutes les publications de ces dernières années concordent à peu près dans le même sens. L'avortement thérapeutique pour tuberculose pulmonaire, qui était relativement fréquent il y a quelques dizaines d'années, est aujourd'hui abandonné par presque tous les auteurs.

De fait, nous publions également les observations des avortements thérapeutiques faits à Baudelocque pendant 10 ans, auxquels nous avons cru pouvoir joindre les avortements normaux des années 1944-1945 ; et nous verrons que ceux-ci n'entraînent pas automatiquement une rémission du processus volutif.

Certains auteurs pensent même que la grossesse aurait une action favorable sur la tuberculose pulmonaire. La présence de l'enfant, quand l'utérus atteint un volume suffisant, joue en effet le rôle d'une phrénicectomie bilatérale. C'est d'ailleurs par le mécanisme inverse, la déplétion brusque de l'abdomen après accouchement, que l'on peut expliquer certaines complications du post-partum.

La suppression des règles joue aussi un rôle important. Sabourin l'avait déjà noté : « Chez les tuberculeuses, la grossesse se passe bien en général, très souvent même sous des dehors favorables semblant autoriser tous les espoirs. C'est que pendant 9 mois les règles sont supprimées et que le poumon, comme tout l'organisme, n'a pas à supporter la répercussion si habituelle, si menaçante toujours, si grave bien souvent, de la crise menstruelle. « On a d'ailleurs observé depuis longtemps que chaque menstruation amène, chez beaucoup de femmes atteintes de tuberculose pulmonaire, une petite poussée évolutive ; et, dans les services de phtisiologie, il est souvent facile de déduire le cycle menstruel d'une femme d'après l'examen de sa feuille de température.

Par contre, la folliculine, dont on sait que le taux augmente pendant la grossesse, agirait en sens contraire. C'est ce qui résulte des expériences entreprises sur des cobayes par Pierre Bourgeois et Madeleine Boquet qui ont constaté que « la folliculine et l'hormone

gonadotrope chez les femelles semblent produire une très légère accélération de la tuberculose expérimentale». Des expériences du même genre ont d'ailleurs été reprises dans le Service, mais elles sont encore insuffisantes pour permettre d'en tirer des conclusions. L'action de l'hyperfolliculinie sur la tuberculose a été aussi évoquée par Paul Viard qui, après avoir rapporté les observations de trois malades, conclue en ces termes : Chez ces malades, nous notons pendant toute la période floride de leur vie des règles extrêmement abondantes, prolongées pendant 8 à 10 jours ; la folliculine, même en excès, paraît entièrement absorbée par sa fonction menstruegène excessive. Puis, tout à coup, chez l'une comme chez l'autre, nous assistons à une oligo, puis à une aménorrhée et tout aussitôt c'est l'explosion d'une tuberculose. Tout paraît se passer comme si l'excès de folliculine restante, dérivée de son rôle physiologique normal, employait son pouvoir fluxionnaire d'abord, puis hématogène ailleurs. »

Une question se pose également pour les cas compliqués pendant la gestation : la tuberculose se serait-elle aggravée en l'absence de grossesse ? C'est un problème évidemment très difficile, sinon impossible à résoudre. On sait en effet que la tuberculose pulmonaire est une maladie à rechutes ; à la faveur d'une maladie intercurrente, d'un affaiblissement de l'état général occasionné par la fatigue, souvent même sans aucune cause apparente, le processus tuberculeux, que l'on croyait en régression ou tout au moins à l'arrêt, recommence à évoluer. C'est de cette façon, pensons-nous, qu'interviennent la gestation et surtout les gestations successives qui occasionnent à la femme une fatigue supplémentaire. Mais ce n'est pas le pronostic de la tuberculose pulmonaire compliquée par la grossesse qu'il faut envisager, mais celui de la tuberculose pulmonaire en général.

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

Nombre d'observations : 31.
Parité par rapport à l'apparition de la tuberculose :

Primipares : 21
Multipares : 10.

Ancienneté de la tuberculose par rapport à l'avortement thérapeutique :

Début pendant la gestation : 5
Moins de 1 an : 3
Entre 1 et 2 ans : 3
Entre 2 et 3 ans : 3
Entre 3 et 4 ans : 2
Entre 4 et 5 ans : 3
Plus de 5 ans : 12.

Motif de l'intervention :

Etat général touché : 9
Reprise de l'évolution : 8
Aggravation des lésions : 7
Bilatéralisation des lésions : 4
Hémoptysies : 2
BK + : 1.

Suites immédiates :

Suites normales : 16
Suites subfébriles : 9
Suites fébriles : 6.

11 femmes sur 31 ont pu être retrouvées.
Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention :

Etat satisfaisant : 9
Hémoptysie : 1
Aggravation : 1.

Etat pulmonaire actuel :

Satisfaisant : 8

Stationnaire : 1
Décès : 2.

Grossesses ultérieures :

2 femmes ont eu 1 grossesse ultérieure sans incident pulmonaire.

FEMMES RETROUVÉES

Obs. N° 692, année 1936. — B... M., 24 ans, III-pare.

Avril 33, au 2e mois de la 1re grossesse : hémoptysie ; B. K. + ; lésion du sommet G.; traitement médical.

Novembre 33 : Forceps pour lenteur de l'expulsion ; D. N.; S. de C. N.

Avril 34, au 3e mois de la 2e gestation : atteinte de l'état général, amaigrissement de 4 kgr.; 5 hémoptysies au cours de la gestation ; traitement par les sels d'or.

Décembre 34 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Octobre 35 : Lésion apicale G. excavée à l'extrême sommet, début de bilatéralisation.

D. R. : 16 au 24 octobre 35.

Janvier 36 : Les lésions D. se sont étendues ; B. K. +.

Le 15 mars 36 : Avortement thérapeutique.

Suites normales. Poids à l'entrée : 54 kgr.; à la sortie : 52 kgr. 400.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : en avril 36 création d'un PNO G. suivi de sections de brides en juin.

Etat pulmonaire actuel : PNO G. toujours entretenu ; les lésions D. se sont calcifiées.

Obs. N° 1135, année 1937. — K... P., 32 ans, I-pare.

1926 : Lésion radiologique nette à G., petite tache à D.; B. K. +.

PNO G. entretenu de 1926 à 1930 ; B. K. : 0.

Bon état général jusqu'en 1933.

1933 : Fléchissement de l'état général, cavité D.; PNO D.

D. R. : 7 au 11 février 37.

Amaigrissement de 4 kgr.

Le 5 mai 37 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : repos à la campagne, l'état général remonte, ainsi que le poids.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant ; vie normale.

Obs. N° 147, année 1938. — P... M., 27 ans, I-pare.

Broncho-pneumonie à l'âge de 10 ans.

D. R. : 26 au 30 août 37.

Décembre 37 : Pleurésie séro-fibrineuse D., vérifiée par ponction.

Le 21 décembre 37 : B. K. 0 ; à cette date, tentative de création d'un PNO qui paraît prendre ; mais l'insufflation suivante est inopérante.

A la radio : sommet partiellement collabé, symphyse de la base.

Etant donné l'impossibilité d'agir sur les lésions de la base, l'impossibilité de remettre à plus tard l'avortement thérapeutique dans le cas où les lésions parenchymateuses évolueraient, on décide l'intervention.

Le 15 janvier 38 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : état satisfaisant.

Nouvelle grossesse en 1944 : aucun incident pulmonaire.

Le 21 mai 45 : Forceps pour modication des B. D. C.; garçon, 3.030 ; D. N.; S. de C. subfébriles.

Obs. N° 2069, année 1938. — C... F., 30 ans, V-pare.

3 gestations N. en 1933, 34 et 35.

1937 : Signes d'imprégnation tuberculeuse au cours de la 4e grossesse ; acc. prématuré par le siège ; fille mort-née ; 2 mois après cet acc. : lésion D., B. K. +. Phrénicectomie D. après tentatives infructueuses de PNO D.

Séjour en sana : amélioration importante jusqu'en mai 38.

D. R. : 5 au 12 juin 38.

Chute de l'état général ; amaigrissement.

Lésions importantes au poumon D., mais peu évolutives ; B. K. +.

Le 30 août 38 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : stabilisé.

Obs. N° 524 bis, année 1939. — G... A., 36 ans, V-pare.

1922 : Congestion pulmonaire double, B. K. 0.

Suivie régulièrement jusqu'en 1927 ; B. K. 0.

1927 : Après le 1er acc. : B. K. +; traitement par les sels d'or.

1931 : 2e grossesse N.; séjour en sana.

1933 : 3e grossesse N.; séjour en sana.

1935 : 4e grossesse N.

3 mois après ce 4e acc. : lésion D.; tentatives infructueuses de PNO D. La malade refuse une thoracoplastie.

D. R. : 5 au 10 décembre 38.

Hémoptysies répétées, B. K. +.

Le 1er mars 39 : Avortement thérapeutique.

Suites subfébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : grande fatigue, une hémoptysie.

Malade décédée le 1er décembre 44 d'une hémoptysie foudroyante.

Obs. N° 598, année 1942. — B... S., 28 ans, III-pare.

2 gestations N. en 1937 et 38.

Octobre 39 : Lésions bilatérales.

Traitement par les sels d'or ; séjour en sana.

D. R. : 24 au 29 octobre 41.

Petite poussée évolutive ; atteinte laryngée ; B. K. +.

Le 20 mars 42 : Interruption de la gestation par voie haute avec stérilisation par ligature des trompes.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant, mais nécessitant toujours un grand repos.

Obs. N° 547, année 1942. — P... Y., 25 ans, III-pare.

2 grossesses N. en 1939 et 40.

Après le 2e acc. : fatigue générale, point douloureux au sommet G.; ni fièvre, ni toux, ni expectoration ; radio négative en juin 40.

Mars 41 : Fatigue générale ; 6 injections de sels de fer ; amélioration.

Décembre 41 : Point douloureux au sommet G., amaigrissement, toux.

D. R. : 5 au 8 janvier 42.

Février 42 : Caverne du sommet G.; PNO G.

Le 8 mars 42 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : arrêt du PNO G. en février 44 après cicatrisation de la lésion.

Obs. N° 2151, année 1942. — J... L., 33 ans, IV-pare.

3 acc. N. en 1926, 30 et 37.

Octobre 37, 3 mois après le 3e acc. : lésions G., B. K. +. Repos chez elle, puis séjour en sana ; sels d'or ; amélioration.

Janvier 39 : Tentatives infructueuses de PNO G. Séjour en sana jusqu'en octobre 40 ; B. K. : 0.

D. R. : 18 au 24 juillet 42.

Octobre 42 : Opacité non homogène surtout à G.; aux 2 sommets, les champs pulmonaires ne paraissent pas en évolution et vraisemblablement d'allure fibreuse ; néanmoins images suspectes rétro-claviculaires G.

Le 9 octobre 42 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : état satisfaisant ; de nouveau enceinte en février 43 ; acc. N. : 4.000 ; D. N.; S. de C. N

Etat pulmonaire actuel : stationnaire.

Obs. N° 2211, année 1943. — A... L., 39 ans, IV-pare.

Début par pleurite D. en 1925 après le mariage.

Au cours de la 1re grossesse (mars-décembre 26) : état général déficient, anémie, phlébite double.

Rien à signaler jusqu'à la 3e grossesse en 1935. 4 mois après l'acc., en mars 36 : pleurésie D., B. K. +; PNO D.; séjour en sana pendant 6 mois ; à la sortie : B. K. 0.

De 1937 à 1939 : Rien à signaler.

De 1939 à novembre 42 : La malade travaille.

Novembre 42 : Taches au poumon G., B. K. +; tentatives infructueuses de PNO G.

D. R. : 5 au 9 juillet 43.

Septembre 43 : B. K. +; PNO D. avec nombreuses brides apicales ; une goutte de liquide dans le cul-de-sac G.; spélonque sous-claviculaire G.; image en mie de pain.

Le 11 octobre 43 : Avortement thérapeutique.

Suites fébriles.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : situation pulmonaire stationnaire, mais la malade doit rester alitée en permanence ; température à 38° le matin et à 39° le soir ; puis la tuberculose gagne les intestins et la malade est décédée le 12 janvier 45.

Obs. N° 1250, année 1944. — L... S., 29 ans, II-pare.

1938 : 1re gestation N.; après l'acc. : amaigrissement, toux, B. K. +, tuberculose bilatérale ; création d'un PNO D. en juillet 38 et d'un PNO G. en mars 39 ; B. K. : 0 ; séjour en sana jusqu'en avril 42.

D. R. : 16 au 20 avril 44.

Reprise de l'évolution du côté G., B. K. +.

Le 13 juin 44 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant ; PNO D. arrêté en août 45.

Obs. N° 1473 bis, année 1945. — V... L., 32 ans, I-pare.

1929 : Lésion D.; sels d'or durant 4 mois ; puis PNO D., mais réaction liquidienne et symphyse.

1931 : Phrénicectomie avec bon résultat.

1937 à 1943 : Activité normale.

Avril 43 : Atteinte G. faible ; séjour en sana ; sels d'or ; calcium.

Septembre 43 : Remaniement lésionnel ; cavité au sommet D.; séjour en sana pendant 8 mois ; puis, bon état général.

D. R. : 14 au 18 avril 45.

Fléchissement de l'état général, amaigrissement, anorexie, état subfébrile.

Le 9 juillet 45 : Avortement thérapeutique.

Suites normales ; amélioration nette de l'état général.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'intervention : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : en amélioration.

FEMMES NON RETROUVEES

Obs. N° 510, année 1935. — G... G., 32 ans, I-pare.

Octobre 26 : Asthénie, amaigrissement, température.

Juin 27 : Radiographie : lésion au poumon D.

Traitement par sels d'or ; puis séjour en sana.

Evolution chronique jusqu'en 1934.

Juillet 34 : Poussée évolutive très accusée, B. K. +.

PNO D. partiellement efficace créé en août 34 et insufflé tous les mois.

Réaction liquidienne en novembre 34.
D. R. : 27 au 30 novembre 34.
Grande asthénie, toux, B. K. +, état fébrile à 38°, état général empiré.
Le 8 mars 35 : Avortement thérapeutique.
Suites subfébriles.

Obs. N° 551 bis, année 1935. — M... J., 17 ans, I-pare.
D. R. : 25 au 31 décembre 34.
A partir de cette époque : grande asthénie, toux, expectoration, anorexie.
Le 26 février 35 : Hémoptysie abondante.
Hospitalisation ; température à 39° ; à la radio : énormes lésions bacillaires du champ pulmonaire D.; B. K. +.
Entre à Baudelocque le 8 mars 35 ; très grande asthénie ; un nouvel examen radiologique montre au 1/3 moyen du champ pulmonaire D. une grosse tache sombre à centre clair ; au pourtour de la lésion, aspect en mie de pain ; sinus costo-diaphragmatique D. obscurci ; à G. : aspect N.
Le 12 mars 35 : Avortement thérapeutique.
Poussée thermique à 39° les 2 jours suivants, puis subfébriles (38°).
L'état général s'améliore ; reprise de l'appétit ; expectoration moins abondante. Sortie le 5 avril 35.

Obs. N° 1485, année 1935. — K... C., 30 ans, III-pare.
2 acc. N. en 1925 et 28 ; D. N.; S. de C. N.
Pleurésie sèche en 1931 ; amaigrissement ; température à 39°-40°.
Deux mois plus tard : hémoptysie.
De 1931 à 1933 : Plusieurs hémoptysies peu abondantes et non fébriles.
Août 33 : Grande asthénie, sueurs nocturnes, expectoration abondante (B. K. +). Quatre tentatives infructeuses de PNO G. pour caverne sous-claviculaire.
Septembre 33 : Phrénicectomie ; puis sels d'or I. V.
L'état général s'améliore, mais B. K. toujours +.
Pendant l'hiver 1934-1935 : 6 hémoptysies non fébriles.
Avril 35 : Asthénie, amaigrissement, quelques petites hémoptysies.
D. R. : 10 au 15 avril 35.
Le 1er juin 35 : Hémoptysie très importante.
A la radio : à G., image cavitaire sous-claviculaire ; phrénicectomie parfaite ; à D., sommet s'éclairant mal.
Le 14 juillet 35 : Avortement thérapeutique.
Suites fébriles.

Obs. N° 1948, année 1935. — H... G., 22 ans, III-geste.
1° 1932 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.
2° 1933 : Avortement de 3 mois ; rétention placentaire, hémorragies.
D. R. : 25 au 29 avril 35.
3e grossesse bien supportée au début ; puis pertes sanguines à partir du 16 août, courtes et progressives jusqu'à l'hospitalisation.
Radio : légère diminution de transparence du sommet G., base irrégulière.

Anémie : 1.860.000 Gl. R.
Le 15 septembre 35 : Avortement thérapeutique.
Poussée fébrile pendant 3 jours, puis suites normales.

Obs. N°2296, année 1935. — L... P., 16 ans, I-pare.
Broncho-pneumonie en 1927.
D. R. : 14 au 17 juillet 35.
Août 35 : Asthénie très marquée, sueurs nocturnes, toux légère.
Septembre 35 : Episode aigu fébrile.
Le 26 septembre 35 : A G., pommelures de tout le champ pulmonaire ; à D., légère infiltration de tout le champ pulmonaire ; B. K. +; PNO G.
Le 28 octobre 35 : Syndrome cavitaire du sommet G., B. K. +, température 38° à 38°5.
Le 1er novembre 35 : Avortement thérapeutique.
Suites fébriles, chute de poids, anorexie, sueurs nocturnes, toux, B. K. +.

Obs. N° 1449, annee 1936. — B... L.-M., 25 ans, I-pare.
Congestion pulmonaire à 17 ans ; depuis, toux incessante.
D. R. : 20 au 23 février 36.
Le 16 mai 36 : Température à 39°5, altération de l'état général.
Tuberculose du sommet G., B. K. +; tentatives infructueuses de PNO G.
Le 13 juin 36 : Avortement thérapeutique.
Aussitôt après l'intervention : température à 40°; endométrite ; puis aggravation de l'état pulmonaire ; sortie non autorisée.

Obs. N° 2553, année 1936. — B... D., 20 ans, I-pare.
Août 33 : Lésion du sommet D., B. K. +.
Septembre 33 : 2 gr. 45 de Crisalbine.
Novembre 33 : Suppression des sels d'or après diarrhée ; adénite cervicale ponctionnée ; amaigrissement de 5 kgr.; toux ; B. K. +.
Juin 34 : PNO D.; les signes généraux persistent.
Décembre 34 : Réaction liquidienne ponctionnée.
Février 35 : PNO D. abandonné pour symphyse ; B. K. +.
Séjour en sana pendant 1 an.
Juin 36 : Rétraction à D.; diminution de clarté sus- et sous-claviculaire G.; poids : 56 kgr. 800.
D. R. : 26 au 30 juin 36.
Octobre 36 : Grosse asthénie, vomissements, toux, B. K. + ; poids : 53 kgr. 20 ; reprise de l'évolution à D.
Le 26 octobre 36 : Avortement thérapeutique.
Suites légèrement subfébriles.

Obs. N° 640, année 1937. — C... R., 23 ans, IV-pare.
3 grossesses N. en 1933, 35 et 36.
D. R. : 6 au 14 novembre 36.
Décembre 36 : Tuberculose bilatérale, surtout à D.; B. K. +.
Janvier 37 : PNO D.
Février 37 : B. K. toujours +, mais meilleur état général.

Interruption de grossesse décidée, basée sur grossesses fréquentes et état pulmonaire non stabilisé.

Le 15 mars 37 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Obs. N° 1409, année 1937. — M... M., 29 ans, II-pare.

1930 : Lésion du sommet D., B. K. +; PNO D.; B. K. : 0.

1932 : Rechute légère.

Septembre 34 : Grossesse bien supportée ; cependant les insufflations deviennent pénibles pendant les derniers mois ; acc. N. à 8 mois ; pas d'allaitement.

3 mois après l'acc. : ensemencement G.

Novembre 35 : Caverne sous-claviculaire G.; PNO G.

Etat général toujours déficient.

D. R. : 23 au 27 mars 37.

La fatigue augmente, la malade doit garder le lit.

A la radio : caverne G. visible, brides ; bonne rétraction à D.

Le 4 juin 37 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Obs. N° 1846, année 1937. — V... B., 19 ans, I-pare.

Janvier 35 : Caverne du sommet D., petites lésions à G., B. K. 0 ; état général mauvais, température subfébrile.

Avril 35 : Tentative infructueuse de PNO D.; 3 mois en sana.

Juillet 35 : Thoracoplastie supérieure D. après B. K. +.

Séjour en sana d'octobre 35 à juillet 36 ; grosse amélioration ; B. K. : 0.

D. R. : 20 au 26 mars 37.

Chute de l'état général.

A la radio : à D., caverne aplatie, à cheval sur la clavicule ; hile chargé ; reste du parenchyme sensiblement normal ; à G., nombreuses lésions disséminées dans le parenchyme semblant évoluer vers la sclérose.

Le 26 juillet 37 : Avortement thérapeutique.

Suites subfébriles.

Obs. N° 856 bis, année 1938. — D... G., 24 ans, II-geste.

Février 34 : Hémoptysie, lésion parenchymateuse D., B. K. +.

Mai 34 : PNO D.

Juillet 34 : Lésion G.; phrénicectomie G.

Jusqu'en septembre 35 : amélioration de l'état général, pas de température, mais persistance de B. K. dans les crachats.

Septembre 35 : PNO G.; bon décollement.

Crachats hémoptoïques dans les jours qui suivent ; puis état stationnaire.

A partir de 1936 : disparition des B. K. dans l'expectoration.

1937 : 1re gestation ; amaigrissement de 3 kgr. en 6 semaines ; avortement thérapeutique à 2 mois ; phlébite G. dans les suites.

Puis état satisfaisant ; pas de température ni expectoration ; on réinsuffle les 2 PNO tous les 15 jours.

D. R. : 26 au 31 janvier 38.

Amaigrissement de 3 kgr. en 2 mois ; asthénie croissante.
Le 11 avril 38 : Avortement thérapeutique.
Suites normales.

Obs. N° 1222, année 1938. — T... P., 33 ans, IV-geste.
1923 : Hémoptysie, lésion G., B. K. +; PNO G. entretenu jusqu'en 27 ; B. K. : 0.
1927 : Poussée évolutive ; lésion D., B. K. +; PNO D. entretenu pendant 2 ans 1/2.
1931 à 1938 : Bon état général, B. K. 0 ; 2 gestations et 1 avortement spontané de 2 mois bien tolérés.
D. R. : 11 au 15 mars 38.
Le 3 mai 38 : Hémoptysie.
A la radio : à D., tractus et calcifications disséminés dans tout le champ pulmonaire ; diaphragme déformé ; sinus bouché ; à G., diminution de la transparence du 1/3 supérieur ; zone d'opacité para-hilaire avec image circulaire de la taille d'une pièce de 2 francs.
Le 25 mai 38 : Avortement thérapeutique.
Suites normales.

Obs. N° 764, année 1939. — V... J., 33 ans, I-pare.
Novembre 33 : Lésions D., B. K. +; PNO D.; B. K. : 0.
D. R. : 10 au 18 janvier 39.
Le 18 mars 39 : Rechute, lésion G., B. K. +.
Le 30 mars 39 : Avortement thérapeutique.
Suites normales après poussée à 40° le lendemain de l'intervention.

Obs. N° 1299 bis, année 1939. — C... Y., 38 ans, III-pare.
2 grossesses N. en 1920 et 30.
1936 : Pleurésie sèche.
D. R. : 6 au 10 avril 39.
Radio du 1er juin 39 : à D., lésions de sclérose pulmonaire ; à G., aspect pommelé à la partie moyenne et supérieure du lobe supérieur.
Le 5 juin 39 : Avortement thérapeutique.
Suites subfébriles.

Obs. N° 1775, année 1939. — J... S., 40 ans, III-pare.
1929 : 1re gestation N.
1933 : Lésion D., B. K. +; repos à la campagne ; B. K. : 0.
1935 : 2e grossesse bien tolérée.
1936 : 2 cavernes au sommet D., B. K. +; PNO D.
1937 : Lésions G., B. K. +; PNO G., B. K. : 0.
D. R. : 15 au 20 mai 39.
Radio de juillet 39 : décollement satisfaisant, plus marqué à D.; déformation des culs-de-sac diaphragmatiques ; parenchyme pulmonaire clair à G.; à D., opacité hilaire très marquée et persistance d'une excavation de la grosseur d'une noix au sommet.
Le 3 août 39 : Avortement thérapeutique.
Suites fébriles.

Obs. N° 2266, année 1939. — F... H., 27 ans, II-geste.

1932 : Pleurésie G.

Pendant la convalescence : fatigue, toux, crachats hémoptoïques.

1933 : Hémoptysie, lésion G., B. K. + ; tentatives infructueuses de PNO G.; phrénicectomie G.

1934 : Séjour en sana ; amélioration nette ; disparition des B. K.

1936 : Hémoptysie, amaigrissement, fatigue ; séjour en sana pendant 2 ans.

1937 : Avortement thérapeutique de 3 mois 1/2 ; suites normales ; amélioration de l'état général.

1939 : Réactivation des lésions ; réapparition d'une image annulaire sous-claviculaire G.

D. R. : 21 au 27 juillet 39.

Le 4 octobre 39 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

Obs. N° 2269, année 1939. — G... M.-L., 23 ans, II-pare.

1933 : 1re gestation N.; phlébite dans les S. de C.

1934 : Lésion sous-claviculaire D., B. K. +; PNO D.

Mars 37 : Interruption du PNO D., car 39° après chaque insufflation, alors qu'entre temps température à 37°.

De mars 37 à août 39 : Suivie régulièrement, B. K. 0.

D. R. : 21 au 27 juillet 39.

Toux, expectoration abondante, hémoptoïque ; asthénie ; B. K. +.

Le 4 octobre 39 : Avortement thérapeutique.

Suites subfébriles.

Obs. N° 2694, année 1939. — C... O., 23 ans, IV-pare.

2 grossesses N. en 1934 et 36.

Septembre 38, au 4e mois de la 3e gestation : lésion D., B. K. + ; PNO D.

Décembre 38 : B. K. 0.

Février 39 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.; pas d'allaitement.

Mars 39 : B. K. +; section de brides ; B. K. : 0.

Octobre 39 : Interruption du PNO D. pour symphyse.

D. R. : 9 au 12 septembre 39.

Le 25 novembre 39 : Avortement thérapeutique en raison des grossesses rapprochées et de l'interruption du PNO.

Suites subfébriles.

Obs. N° 3016, année 1939. — H... L., 24 ans, I-pare.

1934 : Caverne G.; PNO G.

1935 : Réaction liquidienne, B. K. +.

1936 : Résorption totale du liquide ; arrêt du PNO ; amélioration ; B. K. 0.

1937 : Température ; séjour en sana.

Novembre 38 : Lésion D.; PNO D.

D. R. : 19 au 23 octobre 39.

Radio du 16 décembre 39 : à D., PNO ; poumon peu comprimé ; à G.,

tout le poumon est voilé ; nombreuses traînées de sclérose ; grosse oblitération des côtes.

Le 28 décembre 39 : Avortement thérapeutique.

Suites fébriles.

Obs. N° 614, année 1942. — F... R., 29 ans, V-pare.

1934 : 1re grossesse normale.

2 mois après l'acc. : lésion G., B. K. +; séjour en sana ; B. K. : 0.

3 grossesses N. en 1936, 38 et 41.

1 mois 1/2 après le 4e acc. : toux, crachats hémoptoïques, B. K. +.

Séjour en sana jusqu'en février 42.

D. R. : 27 au 30 novembre 41.

Février 42 : Lésions bilatérales, B. K. +.

Le 22 mars 42 : Avortement thérapeutique.

Suites normales.

AVORTEMENTS NORMAUX

Obs. N° 1349, année 1944. — P... G., 18 ans, II-geste.

1° 1943 : Acc. prématuré à 6 mois ; D. N.; S. de C. N.

Encéphalite à l'âge de 9 ans avec paralysie laryngée.

Pleurésie séro-fibrineuse D. à l'âge de 10 ans.

Séjour de 3 ans en préventorium.

1941 : Hémoptysie abondante et fractionnée, lésion du sommet G., B. K. 0 ; PNO G. entretenu depuis.

Février 43, pendant la 1re grossesse : poussée évolutive sous-clavi-culaire D. avec B. K. + pour la 1re fois.

Le 27 juin 44 : Avortement de 4 mois.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'avortement : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : satisfaisant.

2 grossesses ultérieures normales en 1946 et 47.

Obs. N° 615 bis, année 1945. — F... A.-M., 30 ans, I-pare.

Au 2e mois de la grossesse : voile du sommet D.

Le 17 mars 45 : Expulsion d'un œuf complet de 3 mois après rétention pendant 4 mois.

Suites normales.

Obs. N° 640 bis, année 1945. — C... Y., 31 ans, V-geste.

1 acc. N. en 1938 ; D. N. ; S. de C. N.

2 césariennes pour bassin G. R. en 1941 et 43 ; S. de C. N.

1 avortement de 2 mois 1/2 en 1944, suivi de curettage.

3 mois après cet avortement : infiltration apicale D., B. K. +.

Tentative infructueuse de PNO D.; repos ; B. K. : 0.

Le 21 mars 45 : Avortement de 3 mois suivi de curettage.

Suites subfébriles.

Obs. N° 1343 bis, année 1945. — N... I., 19 ans, I-pare.

Avril 45 : Lésion G.

Le 22 juin 45 : Avortement dystocique de 4 mois 1/2 nécessitant des incisions du col pour rigidité de celui-ci.

Flambée pelvienne consécutive avec constitution de 2 masses latéro-utérines très volumineuses, remontant jusqu'à l'ombilic, la D. plus haute que la G., et s'accompagnant de température élevée, irrégulière et d'une formule sanguine compatible avec un processus inflammatoire aigu (10 juillet 45).

Echec du traitement au propidon et de la pénicilline.

Résorption limitée mais certaine des masses abdomino-pelviennes.

Pas de troubles intestinaux ; pas de dyspnée ni de cyanose.

Persistance de la fièvre ; amaigrissement.

Devant ces incohérences cliniques, on fait une radiographie pulmonaire qui donne le diagnostic de granulie (18 août 45).

La malade est décédée le 27 septembre 45.

Obs. N° 2203, année 1945. — R... S., 24 ans, I-pare.

Au 5e mois de la grossesse : apparition brutale de dyspnée ; température oscillant entre 37° et 40°.

Le 9 octobre 45, à 13 heures : avortement à 5 mois d'un fœtus pesant 690 gr.; à 16 heures : raideur meningée, confusion mentale.

Une P. L. montre qu'il s'agit d'une méningite tuberculeuse.

La malade est décédée le 11 octobre 45.

Obs. N° 2265 bis, année 1945. — G... B., 27 ans, I-pare.

1932 : Lésion du sommet D., B. K. + ; PNO D. entretenu pendant 6 ans; B. K. : 0.

Le 16 octobre 45 : Avortement de 5 mois.

Suites normales.

Pendant les 6 mois qui ont suivi l'avortement : état satisfaisant.

Etat pulmonaire actuel : bon.

Obs. N° 2627 bis, année 1945. — R... M., 26 ans, II-pare.

1° 1940 : Acc. N. à T.; D. N.; S. de C. N.

Lésion au poumon G. à l'âge de 8 ans ; séjour en préventorium.

Le 26 novembre 45 : Avortement de 5 mois.

Suites subfébriles.

CONDUITE A TENIR

De l'examen des observations que nous publions, il ressort que parmi les tuberculoses compliquées pendant la grossesse il en est plusieurs qui n'étaient pas traitées ou l'étaient d'une façon insuffisante (Obs. nos 559, 754, 1021, 2262, 2316 et 2540 de l'année 1944 ; Obs. nos 2859 et 2898 de l'année 1945). C'est pourquoi, il est nécessaire d'insister sur la conduite à tenir en présence d'une tuberculeuse qui devient enceinte ou d'une gestante chez laquelle on voit se développer une tuberculose pulmonaire.

Pendant la grossesse, tout l'arsenal thérapeutique sera mis en œuvre : cures de repos, reconstituants, collapsothérapie. Ne pas hésiter à créer un pneumothorax, à en instituer un second s'il y en a déjà un, à faire une phrénicectomie ou même une thoracoplastie si c'est nécessaire. Traiter énergiquement la tuberculose comme si la grossesse n'existait pas. Eviter à l'organisme féminin toute occasion de fatigue supplémentaire.

Au moment de l'accouchement, accélérer la dilatation chaque fois que cela sera possible ; et surtout, ne pas prolonger trop longtemps les efforts expulsifs en terminant l'accouchement par une application de forceps, de préférence sous anesthésie épidurale.

Pendant les suites de couches, s'il y a un pneumothorax, le réinsuffler immédiatement afin d'éviter les changements brusques de pression. Ici encore, les cures de repos seront particulièrement indiquées ; la surveillance médicale doit être de tous les instants pour intervenir d'une manière effective au moindre signe d'alarme. Ne permettre enfin l'allaitement que si les lésions sont cicatrisées depuis longtemps et l'état général excellent.

Il faut regretter qu'une maternité ne soit pas annexée à chaque sanatorium ; les malades pourraient ainsi bénéficier des avantages considérables de la cure sanatoriale pendant et après leur grossesse.

LES ENFANTS

Les enfants des tuberculeuses sont des enfants sensiblement normaux. C'est ce qui résulte de nos observations, ainsi que le montrent les tableaux ci-dessous :

ENFANTS DE PRIMIPARES

Poids à la naissance	Nombre d'enfants	Nombre d'enfants ayant reçu le B.C.G.	Retrouvés bien portants	Anomalies	Décès
Moins de 1.500 gr.	1				1 à 2 heures
Entre 1.500 et 2.000 gr.	1		1		
Entre 2.000 et 2.500 gr.	12	6	4		1 à 12 jours (phemphigus) 1 à 4 mois (hernie étranglée)
Entre 2.500 et 3.000 gr.	43	19	23	1 atrophie des 4 derniers doigts, main droite 1 retard de la marche 1 fragile avec retard de la marche	1 mort-né 1 mort-né avec malformations 1 à 11 jours (otite) 1 à 17 jours 1 à 4 mois (choléra infantile)
Entre 3.000 et 3.500 gr.	48	30	26		1 au cours du travail (pénible) 1 à 4 mois après opération de mastoïdite
Entre 3.500 et 4.000 gr.	23	12	11		1 à 4 jours d'hémorragie méningée (après forceps) 1 mort-né avec malformations 1 à 4 mois après opération de mastoïdite
Plus de 4.000 gr.	4	3	2		

ENFANTS DE MULTIPARES

Poids à la naissance	Nombre d'enfants	Nombre d'enfants ayant reçu le B.C.G.	Retrouvés bien portants	Anomalies	Décès
Moins de 1.500 gr.	1 gross. triple 1				triplés décédés quelques heures après naissance 1 à 17 jours
Entre 1.500 et 2.000 gr.	1				1 à 4 heures
Entre 2.000 et 2.500 gr.	10	4	6		1 à 14 jours (Br-Pn) 1 à 21 jours 1 anencéphale mort-né macéré 1 à 2 mois (Br-Pn)
Entre 2.500 et 3.000 gr.	31	23	19		1 mort-né 1 à 20 jours 1 à 28 jours
Entre 3.000 et 3.500 gr.	48	28	30	1 bec-de-lièvre G. 1 retard de la marche 1 fragile avec retard de la marche	1 à 8 jours 1 à 11 jours 1 à 15 jours (gastro-entérite) 1 à 26 jours d'hémorragie méningée 1 à 3 mois (gastro-entérite)
Entre 3.500 et 4.000 gr.	28	18	15	1 pied bot D.	1 à 15 jours (gastro-entérite)
Plus de 4.000 gr.	8	7	3		1 à 1 an de méningite (avait eu B. C. G.)

Le B. C. G. par scarifications est pratiqué chez tous les enfants issus de mères tuberculeuses, sauf quand celles-ci s'y opposent.

Weymeersch et Olbrechts écrivaient en 1923 : « A l'occasion de faire l'objet de mesures de préservation qu'il est du devoir de la société de prendre à son égard, l'enfant de la tuberculeuse offre donc des chances habituelles de vie saine et normale. » Cette affirmation peut être vérifiée aujourd'hui, car la grosse majorité des enfants de mères tuberculeuses est confiée au Placement Familial des Tout-Petits.

CONCLUSIONS

1° La grossesse ne complique pas la tuberculose pulmonaire dans des proportions aussi considérables qu'on le prétendait il y a quelques dizaines d'années. Le pourcentage des aggravations sévères et définitives est peu important;

2° Les tuberculoses les plus graves sont celles qui débutent cliniquement pendant la gestation;

3° L'avortement thérapeutique est inutile car il n'arrête pas automatiquement le processus tuberculeux évolutif;

4° Les enfants issus de mères tuberculeuses se développent normalement à condition d'être l'objet de mesures de préservation.

Vu :
Le Président de Thèse,
ROBERT GARIPUY.

Vu :
Le Doyen,
J. CALVET.

Vu et permis d'imprimer :
Toulouse, le 30 Septembre 1947;
Le Recteur, Président du Conseil de l'Université,
P. DOTTIN.

BIBLIOGRAPHIE

Les documents concernant le sujet de notre travail sont innombrables. Nous avons jugé bon d'en limiter la bibliographie à ces dix dernières années, renvoyant pour les références antérieures à 1936 aux thèses de Simone KOURILSKY (Paris 1934) et de Ch. LEONARDI (Lyon 1935).

ALFIERI. — Les directives thérapeutiques dans les cas de tuberculose pulmonaire compliquant la grossesse (*Bolletino della Societa de Médico-Chirurgicale de Pavia,* 1936).

— Prophylaxie prénatale dans la lutte contre la tuberculose (*Lotta contra la tuberculosi,* juin 1938).

AUTHIÉ. — Méningite tuberculeuse et puerpéralité (Thèse Paris, 1939).

BACHELLERIE. — Contribution à l'étude de la collapsothérapie chez la femme tuberculeuse enceinte (Thèse Marseille, 1938).

BARNES. — Le pneumopéritoine artificiel dans la tuberculose pulmonaire chez les femmes enceintes (*The Lancet,* 4 novembre 1939, p. 976).

BEC. — Grossesse et tuberculose pulmonaire (*Cahier de pratique medico-chir.*, décembre 1938).

BEC et BÉCHET. — Tuberculose et grossesse (*Arch. médico-chir. de Province,* n° 6, juin 1936).

BERNARD (E.) et MORIN (M.). — Etude critique d'une tuberculose pulmonaire apparue chez une femme enceinte traitée conjointement par pneumothorax et avortement thérapeutique (*Revue de la tuberc.*, 1936, t. 2, n° 4, p. 465).

BLISNJANSKASA et LASAREVITCH. — La thoracoplastie et la grossesse (*Gyn. et Obst.*, septembre 1936, p. 208).

BOURGEOIS (P.) et BOCQUET. — Influence comparée de la castration et des injections de folliculine, d'hormone mâle ou d'hormone gonadotrope du lobe ant. de l'hypophyse sur la tuberculose expérimentale (*C. R. de la Soc. de Biologie,* 1938, t. 2, p. 983).

BOURGEOIS (P.) et TOURNIER. — Eclatement d'une caverne soufflée sous pneumothorax chez une femme enceinte. Disparition totale de l'image cavitaire. Evolution très favorable. Contrôle pleuroscopique (Soc. Méd. des Hôp., séance du 18 juin 1943 ; in *P. M.*, 3 juillet 1943, p. 359).

Braeuning. — Tuberculose pulmonaire et grossesse.

Bricourt. — Tuberculose pulmonaire et grossesse, considérations pratiques (*L'Hôpital*, n° 399, janvier 1936, p. 56).

Brindeau. — A propos de la communication de M. Etienne Bernard (*Revue de la tuberc.*, 1936, t. 2, n° 5, p. 559).

— Indications et procédés opératoires de l'interruption de la grossesse chez les femmes atteintes de tuberculose pulmonaire (*Bruxelles médical*, n° 53, 31 octobre 1937, p. 39).

Buhler et Zettel. — Avortement thérapeutique chez les tuberculeuses pulmonaires (*Münchener medizinische Wochenschrift*, 11 novembre 1938, p. 1749).

Bui. — Un cas de pneumothorax bilatéral chez une gestante (*Revue de tuberc.*, 1936, t. 2, n° 9, p. 1115).

Calov. — La tuberculose au cours de la grossesse (*Med. Journ. Australia*, 1946, n° 7, p. 224).

Carvalho Ferreira. — Orientation thérapeutique dans la tuberculose gravido-puerpérale (*Revista Trasileira de tuberculose*, novembre-décembre 1936, p. 3).

Castlen. — Grossesse et tuberculose (*The Amer. Rev. of Tuberc.*, septembre 1936, p. 340).

Caussade. — Gestation et tuberculose (*Revue de Méd.*, juin 1936 ; *Les Echos de la Méd.*, 15 juin 1936 ; *L'Art Médical*, 18 juillet 1936).

Caussade, Amsler et Lemaître. — Grossesse et tuberculose pulmonaire ; la part des résistances individuelles et l'avenir des gravido-tuberculeuses (*Gaz. des Hôp.*, 6 juillet 1938).

Choitel. — Accouchement au cours du traitement par le pneumothorax artificiel (Thèse Lyon, 1939).

Cleisz et Bret. — Méningite tuberculeuse chez la femme enceinte (Soc. de Gyn. et d'Obst. de Paris, séance du 2 décembre 1940 ; in *P. M.*, 5-8 février 1941, p. 149).

Cohen. — Tuberculose pulmonaire et grossesse (*Brit. Journ. Tuberc.*, 1946, n° 1, p. 10).

Dauwe. — De la conservation de la grossesse chez la femme tuberculeuse (Soc. Belge de Gyn. et Obst., séance du 9 octobre 1937 ; in *Bruxelles médical*, n° 2, 14 novembre 1937).

Debienne. — Grossesse au cours d'un pneumothorax (*Centre Médical*, mai 1938).

Desbordes. — Du traitement de la tuberculose pulmonaire chez la femme enceinte (Thèse Montpellier, 1939).

Dumarest et Léonardi. — Grossesse et formes cliniques de la tuberculose pulmonaire (*Le Bulletin médical*, 18 juillet 1936).

Duret. — La tuberculose pulmonaire de la femme (Thèse Paris, 1941).

Eltore et Tellini. — Précisions sur le thème : tuberculose et grossesse (*Lotta contra la tuberc.*, 1946, n° 2, p. 106).

Eparvier et Bertaud. — Tuberculose à développement rapide dans les S. de C. immédiates avec probabilité d'hérédité bacillaire chez l'enfant (*Gyn. et Obst.*, 1946, t. 5 *bis*, p. 583).

Falkenfleth. — Y a-t-il indication à provocation de l'avortement chez les femmes tuberculeuses, eu égard au sort des enfants (*Nordisk Medisin Hospitalstidende*, 11 janvier 1941, p. 99).

Fischer. — Influence possible d'une grossesse sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire (*Le Concours médical*, 7 août 1938, p. 2110).

Floutard. — Méningite tuberculeuse et gestation (Thèse Paris, 1939).

Freschard. — Influence prédominante des facteurs sociaux et psychiques sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire dans la puerpéralité (Thèse Paris, 1936).

Friedman et Garber. — Grossesse et tuberculose (*Amer. Rev. of Tuberc.*, 1946, n° 3, p. 275).

Frisch. — Tuberculose pulmonaire et grossesse (*Wienner Klinische Wochenschrift*, 16 octobre 1936, p. 12).

Gintry. — Effets comparatifs de la grossesse et de la phrénicectomie sur le diaphragme et leurs relations avec la tuberculose pulmonaire (*Amer. Journ. of Obst. and Gyn.*, février 1938 ; in *Revue Franç. de Gyn. et Obst.*, octobre 1938, p. 818).

Guillemin et Chabeaux. — Thoracoplastie et grossesse (Soc. de Méd. de Nancy, séance du 25 novembre 1936 ; in *Revue Méd. de Nancy*, janvier 1937).

Harjoth. — Cas de méningite tuberculeuse pendant la grossesse (*Uges k. f. Lager*, juin 1938).

Hartman. — L'avortement thérapeutique chez la tuberculeuse pulmonaire est-il légitime ? (*Revue Franç. de Gyn. et Obst.*, février 1938, p. 83).

— L'influence possible d'une grossesse sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire (*Le Concours médical*, 14 août 1938).

Harttung. — Thoracoplastie totale et accouchement (*Zentrablatt für Gynakologie*, 24 décembre 1938, p. 2865).

Hughes. — La tuberculose pulmonaire au cours de la grossesse (*Med. Journ. Australia*, 1946, n° 7, p. 230).

Jacob. — Un nouveau cas de tuberculose aiguë du post-partum ayant pour point de départ une tuberculose génitale (Soc. Méd. des Hôp. de Paris, 1945, nos 21-23).

Jacob et Bareau. — Tuberculose aiguë du post-partum et tuberculose génitale (Soc. Méd. des Hôp., séance du 28 mars 1941 ; in *P. M.*, 2-5 avril 1941, p. 365).

Jottras. — Tuberculose et maternité (*Languedoc médical*, novembre 1937).

Kapler. — Grossesse, tuberculose, sels d'or (Thèse Paris, 1937).

KOURILSKY (S.). — La tuberculose pulmonaire chez la femme enceinte (Thèse Paris, 1934).

LABAUME. — La tuberculose pulmonaire chez la femme enceinte (*L'Union Méd.*, 10 janvier 1936, et *Sciences Méd.*, mars 1936).

LACOMBE et CHEMIN. — Grossesse et tuberculose pulmonaire. Efficacité du pneumothorax thérapeutique (*L'Echo Méd. du Nord*, 15 septembre 1939).

LENORMANT. — Sur le traitement des tuberculoses pulmonaires et obstétricales (*Le Progrès médical*, 11 novembre 1939, p. 1259).

LÉONARDI. — Grossesse et formes anatomo-cliniques de la tuberculose pulmonaire (Thèse Lyon, 1935).

LUTON, LEFÈVRE et RENAR. — Considération sur la grossesse et la tuberculose (Soc. des Sc. Méd. de Clermont-Ferrand, séance du 28 mars 1943 ; in *P. M.*, 21 août 1943, p. 457).

MADSEN. — Un cas de méningite tuberculeuse au cours de la grossesse (*Acta Obst. et Gyn. Scandinav.*, 1937).

MAHON et DARMAILLACQ. — Péritonite tuberculeuse dans les suites de couches (*Gyn. et Obst.*, 1944-1945, n° 10, p. 341).

MARIETTE. — Anticonception au cours de la tuberculose (*Amer. Rev. of Tuberc.*, février 1937, p. 216).

MECKEN. — Tuberculose pulmonaire et avortement thérapeutique (Soc. Belge de Gyn. et Obst., juillet 1937 ; in *Revue Franç. de Gyn. et Obst.*, novembre 1938, p. 893).

MOSCHKOWITZ. — Tuberculose et grossesse. Tuberculose osseuse, laryngée (Thèse Bordeaux, 1940).

MOURGUE-MOLINES, VIDAL et FOURCADE. — Thoracoplastie et grossesse (Soc. des Sc. Méd. et Biol. de Montpellier et du Languedoc Méditerranéen, séance du 6 mars 1942 ; in *P. M.*, 19 septembre 1942, p. 585).

MOURGUE-MOLINES, VIDAL et FAURE. — Pneumothorax extra-pleural et grossesse (Soc. des Sc. Méd. et Biol. de Montpellier et du Languedoc Médit., séance de mars 1944 ; in *P. M.*, 5 août 1944, p. 235).

PETERS et DAVENPORT. — Grossesse et accouchement au cours du pneumothorax artificiel bilatéral (*Amer. Rev. of Tuberc.*, janvier 1937).

PETIT. — Grossesse et tuberculose (*Courrier médical*, 22 novembre 1936).

POLLAK et POTTER. — Grossesse et tuberculose (*Tubercle*, janvier 1940).

POPPER et PINCU. — Pneumothorax trans-partum (*Rev. Obst. et Gyn. Puericultura*, 1937, n° 1, p. 18 ; in *Gyn. et Obst.*, janvier 1938, p. 74).

PORTES, GRANJON et HEUVILLE. — Tuberculose et gémellité (*Gyn. et Obst.*, 1947, n° 1, p. 112).

PRALORAN. — Sur la collapsothérapie au cours de la grossesse (*Clin. Obst.*, décembre 1936).

PUELMA. — Tuberculose et grossesse (*Archives Méd.-Chir. de l'appareil* respiratoire, 1939, n° 2, p. 81).

RAMOND. — Pleurésie séro-fibrineuse et grossesse (*P. M.*, 7-10 janvier 1942, p. 39).

REVEL. — Les indications thérapeutiques chez la tuberculeuse gravide (Thèse Paris, 1940).

RHENTER, LYONNET et BERTAUD. — Tuberculose laryngée en fin de gestation ; accouchement provoqué ; enfant décédé au 19e jour avec des lésions de tuberculose congénitale (*Gyn. et Obst.*, 1946, n° 5 *bis*, p. 602).

SAKKA. — Tuberculose pulmonaire, pneumothorax thérapeutique et grossesses (*Revue de la Tuberc.*, 1939-1940, n° 8, p. 970).

SIDALL. — Tuberculose et grossesse (*Michigan Journ. M. Soc.*, janvier 1938).

SKILLEN et BOGEN. — Grossesse et tuberculose (*The Journ. of the Amer. Med. Assoc.*, 24 septembre 1938, p. 1153).

STAMPFLI. — L'influence de la tuberculose sur la maternité (*Schw. Med. Wschr.*, 1946, n° 48, p. 1240).

TAPIE. — Indications de la phrénicectomie et de la phréno-alcoolisation au cours de la grossesse (Soc. de Méd. Chir. et Pharm. de Toulouse, séance de février 1946 ; in *P. M.*, 25 mai 1946, p. 353).

TRILLAT et WOTTER. — Pronostic obstétrical de la tuberculose pulmonaire traitée par le pneumothorax artificiel (*Lyon médical*, 23 février 1941, p. 121).

VADJA. — Emploi du pneumopéritoine dans la collapsothérapie de la tuberculose pulmonaire. Recherches pour savoir si cette méthode est utilisable à la fin de la gestation ou immédiatement après l'accouchement (*Zeitschrift für Tuberkulose*, décembre 1937, p. 27).

VIARD. — Tuberculose et hyperfolliculinie (*Archives Hospitalières*, juillet 1944, p. 205).

VORON et BROCHER. — De l'emploi de la méthode lente (laminaire) pour l'avortement thérapeutique dans la tuberculose pulmonaire. Technique simple et résultats favorables (*Bull. Soc. Obst. et Gyn. de Paris*, 1937, p. 306).

WEBER. — Tuberculose active et grossesse (*Münchener medizinische Wochenschrift*, 18 avril 1941, p. 463).

WODON. — Gynécologie et obstétrique de la femme atteinte de tuberculose pulmonaire (Soc. Belge d'Etudes Sc. sur la tuberc., séance du 3 décembre 1936; in *Bruxelles médical*, 7 février 1937, p. 554).

YOUNG. — Tuberculose pulmonaire et grossesse (*The British Med. Journ.*, 17 octobre 1936, p. 749).

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Introduction	7
Statistiques antérieures et statistiques de Baudelocque	9
Tuberculoses non compliquées par la grossesse	12
Tuberculoses compliquées pendant la grossesse	42
Tuberculoses compliquées uniquement pendant les suites de couches.	55
Tuberculoses débutant cliniquement pendant la grossesse	63
Tuberculoses ayant débuté cliniquement après un accouchement ou un avortement	77
Conclusion et Etio-Pathogénie	82
Avortements thérapeutiques	84
Conduite à tenir	96
Les enfants	97
Conclusions	99
Bibliographie	100

626. — Imp. Jouve et Cie, 15, rue Racine, Paris (N° 31.0939). — 10-47.